

# Max Tétau

## Homéopathie et Insuffisance veineuse des membres inférieurs

Leseprobe

[Homéopathie et Insuffisance veineuse des membres inférieurs](#)  
von [Max Tétau](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b10108>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH  
Blumenplatz 2  
D-79400 Kandern  
Tel. +49 7626 9749 700  
Fax +49 7626 9749 709  
Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)  
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen  
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



# Les ulcères variqueux

L'ulcère variqueux est provoqué par une thrombose veineuse, c'est-à-dire une obturation, et représente une complication trophique majeure de la stase veineuse, elle-même en rapport avec l'existence des varices sous-jacentes.

Cette stase précède l'ulcère, le conditionne et permet d'ailleurs de le prévoir à partir du moment où se produit une thrombose. A ce stade, nous pourrions donc avoir une politique préventive.

Le syndrome de stase se traduit par un œdème évident ou discret, d'abord vespéral, puis permanent. Un purpura par hémorragie capillaire se développe, conduisant à une dermite ocre improprement appelée **eczéma variqueux**. Au début, il s'agit souvent d'une simple dermite irritative favorisée par l'insuffisance de vascularisation du derme. Cette dermite s'infecte, donc eczéma microbien, ou est transformée en eczéma de contact par applications de pommades supposées désinfectantes ou cicatrisantes.

Rappelons-nous : moins on met de choses sur la peau, mieux cela vaut.

A partir de là, la thrombose va déclencher toute la pathologie.

Cette thrombose peut passer inaperçue. On la détecte à l'interrogatoire en tenant compte des accouchements, des

interventions chirurgicales, de la notion d'oedème, de douleurs dans les mollets. Souvent on ne retrouve rien. Pourtant, les troubles trophiques, le processus ulcératif observés témoignent de la réalité de l'obturation.

Ce syndrome post-thrombotique se caractérise alors par des troubles trophiques plus sévères : lymphœdème dur ne prenant pas le godet, hypodermite sclérodermi-forme, inflammations locales répétées, finissant par engainer la jambe d'un tissu scléreux qui aggrave la stase veineuse, l'oedème et provoque un déficit circulatoire, aussi bien artériel, là, que veineux.

Des plaques d'atrophie blanches apparaissent formées de tâches gris blanchâtre, rêches, scléreuses, entourées de petites télangiectasies violacées en rapport avec des micro-infarctus cutanés.

Ces modifications du tégument fragilisent la jambe et la mettent à la merci de la moindre blessure, du moindre choc qui provoque la formation de l'ulcère, mettant en défaut les processus spontanés de cicatrisation.

L'ulcère une fois creusé, nous distinguerons :

—**L'ulcère variqueux non compliqué.** Il siège en général sur la face interne de la jambe, assez bas, au niveau de la malléole interne. Il repose en fait sur une performante incontinente.

Il est à limites nettes, arrondies ou irrégulières, avec périphérie cutanée normale. Le fond de l'ulcère est au niveau de la surface de la jambe. Ce fond est rouge vif, propre ou recouvert d'un mince exsudât jaunâtre. Sa taille peut varier de un à une dizaine de centimètres de diamètre.

—**L'ulcère variqueux post-phlébitique.** Il siège plus haut, sur la face externe ou postérieure de la jambe.

Les bords sont durs et en relief. Ils surplombent un fond rougeâtre ou noirâtre recouvert d'une couche muqueuse épaisse et adhérente au stade de l'ulcère compliqué.

La participation artérielle est fréquente et entraîne des phénomènes très douloureux. Les Dopplers artériel et veineux nous renseignent.

L'hypertension artérielle est d'ailleurs un facteur aggravant dans ces ulcères de la jambe.

Enfin les surinfections microbiennes sont fréquentes, à germes à Gram + ou Gram -.

Sur le plan local, l'ulcère variqueux non compliqué est assez simple à traiter.

On maniera les pansements gras, les bains désinfectants, le repos au lit, la contention veineuse en position debout par bande élastique. Tout doit s'arranger en quelques semaines.

En revanche, en cas d'ulcères compliqués anciens, à participation artérielle, le problème est plus complexe.

Il faut réaliser une détersion mécanique de l'ulcère à la pince ou au bistouri, en évitant les enzymes protéolytiques douloureux et peu efficaces. On peut s'aider de poudre de dextran polymérisé de façon à obtenir une bonne détersion.

Puis on stimule le bourgeonnement cicatrisant par l'application de pansements gras, où le Calendula peut être introduit.

Parfois, il faut s'adresser, lorsque l'ulcère est de très grande taille à l'hospitalisation et à la greffe de peau.

Souvent, il faut recourir dans les suites d'ulcère à la sclérose veineuse, voire à la chirurgie pour éviter la récurrence.

Mais tout cela ne se conçoit qu'associé au traitement

homéopathique qui combattra les phénomènes douloureux, accélérera la cicatrisation, diminuera les risques d'infection, prendra également en charge le traitement de fond de la maladie veineuse.

## **I. TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE PONCTUEL DE L'ULCÈRE**

### **II répond à quatre impératifs :**

- combattre la douleur,
- combattre surinfection et suppuration,
- faciliter la cicatrisation,
- drainer le territoire touché.


### **A. Combattre la douleur**

Nous tiendrons évidemment compte du caractère même de la douleur pour sélectionner le ou les remèdes selon la loi du semblable.

Définir avec précision le caractère d'une douleur n'est pas chose aisée. La contemplation de certains répertoires comme celui de Kent où sont définies de multiples variétés de douleurs laisse songeur.

Qu'est-ce qu'une douleur spongieuse ? Quelle différence y a-t-il entre une douleur élançante et une douleur tirillante ? Sur le plan sémantique, tout peut s'expliquer. Mais quand il s'agit d'obtenir une réponse du malade, c'est une toute autre affaire. Son air étonné est admirable, l'imprécision de sa réponse embarrassante.

Toutefois, en matière d'ulcère veineux, il y a des sensa-



Max Tétau

[Homéopathie et Insuffisance veineuse des membres inférieurs](#)

126 Seiten, kart.  
erschienen 1998



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)