

Karl Gustav Schmalz Medizinische Diagnostik

Leseprobe

[Medizinische Diagnostik](#)

von [Karl Gustav Schmalz](#)

Herausgeber: Ahlbrecht Verlag



<https://www.narayana-verlag.de/b26881>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Ä Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>



Inhaltsanzeige

Einleitung [41-58]

Tab.

1. Sitz der Krankheit [S. 59-61]
 - I. Oertliche Krankheit
 - β . Symptome
 - b. Organische, mechanische Krankheit
2. Charakter der Lebensäußerung [S. 61-67]
 - I. Asthenie
 - b. Asthenisch nervöse Konstitution
 - c. Organische Schwäche
 - d. Verwundbarkeit
 - II. Sthenie
 - b. Sthenisch phlogistische Konstitution
 - III. Verkehrte Lebensäußerung
3. Verminderte Kraftäußerung [S. 67-73]
 - I. Entkräftung
 - II. Unterdrückung der Kräfte
 - b. Ermüdung
 - III. Nervenschwäche
 - β . Hypersthenie
 - b. Starke Nerven
4. Charakter des Fiebers [S. 73-76]
 - I. Sthenisches Fieber
 - II. Asthenisches Fieber
5. Typus des Fiebers [S. 76-80]
 - I. Wechselfieber
 - β . Nervenfieber, Folgefieber
 - II. Anhaltendes Fieber
6. Hauptarten des Fiebers [S. 80-86]
 - I. Entzündliches Fieber
 - b. Einfaches Reitzfieber
 - II. Faulfieber

Tab.

- b. Synochus
- III. Nervenfieber
7. Spielarten des Fiebers [S. 86-98]
 - I. Darmfieber
 - II. Entzündlicher Typhus
 - B. Brennfieber
 - III. Katarrhalfieber
 - b. Flußfieber
 - IV. Wochenfieber
 - V. Pestfieber
 - B. *Hemitritaeus Daciae*
 - C. Englischer Schweiß
 - VI. Ausschlagfieber
 - VII. Zehrfieber
 - b. Phthisisches Fieber
8. Oertlicher Schmerz [S. 98-112]
 - I. Oertliche Entzündung
 - II. Rheumatismus
 - B. Muskelentzündung
 - III. Rothlauf
 - B. Hautentzündung
 - IV. Gicht
 - V. Falscher Gliederfluß
 - B. Entzündung der Lymphgefäße
 - C. Muskelschmerz von Verletzung
9. Einzelne Geschwülste im Allgemeinen [S. 112-132]
 - I. Entzündungsbeule
 - β . Hautbeule
 - γ . Frostbeule
 - δ . Falscher Abszeß
 - b. Kongestionsabszeß
 - B. Quetschung
 - b. Blutbeule
 - c. Blutunterlaufung
 - C. Blutschwamm

- Tab.
- β. Melanose
 - II. Gemeiner Blutschwär
 - β. *Furunculus spurius pustulodes*
 - B. Brandschwär
 - C. Karfunkel
 - III. Falscher Krebs
 - IV. Wirklicher Bruch
 - β. Falscher Bruch
 - V. Wahre Schlagadergeschwulst
 - β. Unächte S.
 - γ. Scheinbare S.
 - b. Krampfadrige S.
 - c. Anastomotische S.
 - VI. Blutadergeschwulst
 - b. Blutgeschwulst
 - VII. Drüsengeschwülste
 - VIII. Lymphgeschwulst
 - b. Wassersackgeschwulst
 - B. Milchgeschwulst
 - IX. Balggeschwulst
 - β. Nervengeschwulst
 - γ. Knochenauswuchs
 - δ. *Tumor venereus, mercurialis*
 - b. Falsche Balggeschwulst
 - X. Fleischgewächs
 - B. Blutabsondernde Knoten
 - β. Knochenmarkgicht
 - 10. Knochengeschwülste [S. 133-138]
 - I. Knochenauswuchs
 - β. Fleischgeschwulst
 - γ. Knochenschwiele
 - II. Knochenerweichung
 - B. Brüchigkeit der Knochen
 - b. Knochenschwindsucht
 - β. Angeborene Düntheit der Knochen
 - III. Knochenbrand
 - 11. Gelenkgeschwülste [S. 139-146]
 - I. Innere Gelenkgeschwulst
 - II. Gelenkwassersucht
 - B. Verdickung des Gelenkwassers
 - III. Gliedschwamm
 - b. Schleimbeutelgeschwulst
 - IV. Außere Gelenkgeschwulst
 - 12. Aufgetriebenheit der Haut [S. 146-152]
 - I. Allgemeine Hautwassersucht
 - β. Eiterige Anschwellung
 - γ. *Turgor cutis*

- Tab.
- II. Verhärtung des Zellgewebes
 - b. *Sclerema spuria*
 - B. Knollsucht
 - III. Windgeschwulst
 - B. Hysterische Anschwellung
 - IV. Hautgeschwulst
 - 13. Unbeweglichkeit einzelner Glieder [S. 152-158]
 - I. Freiwillige Schwerbeweglichkeit
 - II. Schwerbeweglichkeit mit Verletzung
 - 14. Unfreiwillige Gliederbewegungen [S. 158-171]
 - I. Zuckungen
 - II. Tanzsucht
 - III. Gichter
 - IV. Fallsucht
 - b. Verstellte Fallsucht
 - V. Kriebelsucht
 - β. Sehnenhüpfen
 - VI. Mondsucht
 - β. Träumen
 - γ. Schlaftrunkenheit
 - VII. Wasserscheu
 - VIII. Muskularunruhe
 - β. Zittern
 - δ. Unruhe
 - b. Rastloser Wahnsinn
 - β. Milzsüchtige Angst
 - c. Heimweh
 - β. Verstelltes Heimweh
 - 15. Abnorme Thätigkeit der Seelenkräfte [S. 171-183]
 - I. Grillenkrankheit
 - II. Fixer Wahnsinn
 - b. Liedeswuth
 - β. Geilheit
 - c. Schwermuth
 - B. Verstellter Wahnsinn
 - III. Narrheit
 - β. Naivetät
 - b. Kindischwerden
 - IV. Blödsinn
 - β. Vorübergehender Blödsinn
 - γ. Scheinbarer Blödsinn
 - b. Cretinismus
 - c. Dummheit
 - B. Irrthum
 - V. Irrwahn

Tab.

16. Stillestand aller Lebensäußerung [S. 183-188]
- I. Ohnmacht
 - γ. Simulirter Tod
 - II. Wahrer Tod
 - Todtenserstarrung
17. Gewaltsame Todesarten [S. 188-193]
- I. Durch Entziehung der Lebensstoffe
 - II. Durch Ueberreizung
18. Unbeweglichkeit mit Bewußtseyn [S. 193-197]
- I. Halbschlag
 - B. *Parapoplexia*
 - β. Kraftlosigkeit
 - II. Todtenkrampf
 - δ. *La Crampe*
 - ε. Krankheit der 7 Tage
 - ζ. Frieren
 - η. Allgemeine Verknöcherung
19. Gehirnleiden [S. 197-201]
- I. Selbstständiges Gehirnleiden
 - II. Abhängiges Gehirnleiden
20. Unterdrückung der willkürlichen Lebensäußerung [S. 201-214]
- I. Schlagfluß
 - B. Schlafsucht
 - C. Schwindel
 - II. Steckung
 - B. Schwerathmen
 - III. Alpdrücken
 - B. *Paroxysmus hypochondriacus*
 - C. Angst
 - IV. Schlummersucht
 - b. Magnetischer Schlaf
 - B. Wachende Schlafsucht
 - V. Starrsucht
 - b. Steifsucht
 - VI. Verzuckung
 - b. Vertiefung
 - β. Zerstreuung
 - B. Dumpfer Wahnsinn
 - b. Stumpfsinn
 - C. Fühllosigkeit
 - b. Betäubung

Tab.

21. Besondere Gehirn- u. Nervenleiden [S. 214-238]
- I. Akute Vergiftung
 - β. Scheinbare Vergiftung
 - II. Hirnentzündung
 - III. Hirnverletzung
 - B. Konsensuelles Hirnleiden von Gewaltthat
 - IV. Organisches Hirnleiden
 - V. Kopfkongestionen
 - bb. Bluterguß im Gehirn
 - b. Metastat. u. sympath. Hirnleiden
 - B. Nervöses Hirnleiden
 - VI. Fieberhirnleiden
 - b. Febris remittens soporosa
 - VII. Paroxysmus hystericus
 - VIII. Wurmkrankheit
 - β. Skrofelfieber
 - IX. Hirnwassersucht
 - X. Schläffieber
 - b. Alltagswechselfieber
 - XI. Schwerzähnen
22. Anschwellungen am Kopfe [S. 238-245]
- I. Hirnhautwassersucht
 - II. Aeußerer Wasserkopf
 - B. Aeußere Kopfverletzung
 - b. Hirnentzündung nach Verletzung
 - C. Entzündung der Kopfmuskeln
 - b. Kopfrosee
 - III. Aeußere Kopfgeschwulst
 - IV. Hirngeschwulst
 - B. Markschwamm des Gehirns
23. Schmerz im Umfange des Kopfes [S. 245-265]
- I. Gemeiner Kopfschmerz
 - B. Migräne
 - II. Gehirnleiden
 - B. Fieberkopfschmerz
 - C. Aeußere Kopfentzündung
 - III. Stirnhöhlschmerz
 - B. *Neuralgia frontalis*
 - C. Augenentzündung
 - IV. Oberkieferhöhlenschmerz
 - b. Nervenanschwellung in der Kieferhöhle
 - B. Krankheiten des Oberkieferknochens
 - V. Nasenschmerz

Tab.

- VI. Lippenkrankheiten
- VII. Gesichtsschmerz
- VIII. Ohrenscherz
 - B. Ohrtönen
- IX. Verletzung am Unterkiefer
 - B. Beschwerliches Kauen
- X. Kinnbackenkrampf
 - b. Mundkrampf
 - B. Lähmung der Gesichtsmuskeln
 - C. *Ancylosis maxillarum*
 - D. *Mastoidealgia*
- XI. Zahnschmerz
 - β. Stumpfseyn der Zähne
- 24. Entzündung der Augen [S. 266-272]
 - I. Innere Augenentzündung
 - II. Aeußere Augenentzündung
- 25. Aeußere Augapfelentzündung insbesondere [S. 272-277]
 - I. Entzündung der Bindehaut
 - II. Entzündung der weißen Haut
 - B. Entzündung der Hornhaut
 - III. Entzündung der Aderhaut
 - β. Kongestionen der Aderhaut
 - γ. Anhäufung des schwarzen Pigments
 - δ. Varikosität der Aderhaut
 - ε. Mangel an schwarzem Pigment
- 26. Augenhöhlenentzündung insbesondere [S. 277-279]
 - I. Entzündung im Nasenwinkel
 - II. Entzündung hinter dem Augapfel
 - b. Entzündung der Augenmuskeln
 - III. Entzündung im Schlafwinkel
 - b. Vermehrte Thätigkeit der Thränen-drüse
- 27. Augenliederentzündung insbesondere [S. 280-281]
 - I. Innere Augenliederentzündung
 - II. Aeußere Augenliederentzündung
- 28. Arten der Augenentzündung [S. 281-289]
 - I. Flußartige Augenentzündung
 - B. Ansteckende Augenentzündung
 - II. Skrofulöse Augenentzündung
 - b. Skorbutische Augenentzündung
 - c. Ophthalmie der Neugeborenen
 - III. Venerische Augenentzündung
 - bb. Mercurielle Augenentzündung

Tab.

- b. Augentripper
- c. Venerisch-skorbutische Augenentzündung
- IV. Exanthematische Augenentzündung
 - B. Psorophthalmie
- V. Sanguinische Augenentzündung
 - β. Intermittirende Augenentzündung
 - b. Gastrische Augenentzündung
- 29. Verdunkelung des Gesichts [S. 290-315]
 - I. Grauer Staar
 - B. Nachstaar
 - C. Unächter Graustaar
 - II. Schwarzer Staar
 - B. Amblyopie
 - III. Glaukom
 - b. Auflösung des Glaskörpers
 - IV. Falschsehen
 - V. Ergießungen im Auge
 - VI. Ergießungen am Auge
 - VII. Entzündliche Gesichtsverdunkelung
 - VIII. Verschließung der Augen
 - B. *Synechia*
 - C. *Mydriasis*
 - D. Zittern der Iris
 - b. *Hippus pupillae*
 - IX. Hornhautfleck
 - β. Fremde Körper in der Bindehaut
 - b. Verdunkelung der hintern Hornhaut
 - B. Augenfell
- X. Traubenauge
 - B. Vorfall der Regenbogenhaut
- XI. Augenauswuchs
 - b. Markschwamm der Netzhaut
- 30. Augengeschwülste [S. 316-324]
 - I. Geschwulst der Augenlieder
 - B. Umkehrung
 - C. Vorfall
 - b. Lähmung
 - c. Krampf
 - β. Lichtscheu
 - d. Hasenaugenauge
 - II. Geschwulst in der Augenhöhle
 - III. Geschwulst der Thränenwege
- 31. Gehörfehler [S. 324-328]
 - I. Harthörigkeit

Tab.

- II. Taubheit
 - B. Falschhören
- 32. Geschwülste in der Mundhöhle [S. 328-331]
 - I. Mundgeschwulst
 - II. Zungengeschwulst
 - B. Zungenvorfall
 - β. Verschlucken der Zunge
- 33. Aeußere Halsgeschwülste [S. 331-338]
 - 1. Kropfgeschwulst
 - B. Wahres Aneurysm am Halse
 - β. Scheinbares Aneurysm am Halse
 - b. Blutadergeschwulst am Halse
 - II. Halsdrüsengeschwulst
 - B. Eitergeschwulst am Halse
 - C. *Hydrorrhachis cervicalis*
 - III. Schiefer Hals
 - B. Schiefer Hals von Gewaltthätigkeit
- 34. Erschwertes Schlingen [S. 339-344]
 - I. Dysphagie von Entzündung
 - b. – von Giften
 - c. – bei der Wasserscheu
 - d. – von Geschwüren
 - e. – von fremden Körpern
 - f. – von Verrenkung
 - g. – von Mundgeschwülsten
 - II. Verengung der Speiseröhre
 - III. Krampf der Speiseröhre
 - b. Cardiaplegie
 - B. *Dysphagia lusiora*
 - IV. Atonie der Speiseröhre
- 35. Geschwürige Bräune [S. 344-357]
 - I. Bösartige Bräune
 - γ. Faulfieberbräune
 - II. Entzündliche Bräune
 - B. Scheinbare Eiterung im Munde
 - III. Mundfäule
 - IV. Venerische Bräune
 - b. Verletzung im Munde
 - B. Flechtenbräune
 - V. Schwämmchen
 - B. Falsche Schwämmchen
 - C. *Aphthae stomacacoides*
 - VI. Westindische Schwämmchen
 - VII. Seröse Bräune

Tab.

- 36. Entzündung des Halses [S. 357-363]
 - I. Schlundbräune
 - II. Luftröhrenbräune
 - III. Muskelbräune
 - IV. Rachenbräune
 - V. Ohrdrüsenbräune
- 37. Erschwertes Athmen [S. 363-383]
 - I. Hautbräune
 - b. Mechanische Verengung der Luftröhre
 - II. Millars Asthma
 - b. Wigands Asthma
 - III. Blausucht
 - IV. Keuchhusten
 - V. Brustbräune
 - B. *Pneumonia epileptica*
 - C. *Asthma pathematicum*
 - VI. Entzündliches Schwerathmen
 - B. Brandiges Schwerathmen
 - VII. Krampfasthma
 - B. Wechselfieberasthma
 - VIII. Katarrh
 - b. Unächter Kroup
 - B. Schleimige Engbrüstigkeit
 - b. Lungenverstopfung
 - c. *Asthma pulverulentum*
 - C. Steckfluß
 - b. *Asthma period. acut. pituit.*
 - IX. Ueberfüllung der Brust
 - b. Fettanhäufung in der Brust
 - c. Brustgeschwülste
 - B. Verwachsungen in der Brust
 - C. Brustbrüche
 - D. *Asthma abdominale*
 - b. *Asthma medullare*
 - E. *Anaemia*
- 38. Ueberfüllung der Brust insbesondere [S. 383-396]
 - I. Brustwassersucht
 - II. Brusteitersucht
 - III. Blutbrust
 - b. Zerreißen in der Brust
 - B. Brustkongestionen
 - IV. Scheinbare Eiterbrust
 - B. Schleimbrust
 - C. Fettanhäufung
 - V. Sackbrustwassersucht
 - VI. Brustwindsucht

Tab.

- 39. Herzzufälle [S. 396-402]
 - I. Wahre Herzzufälle
 - II. Unächte Herzzufälle
- 40. Aechte Herzkrankheiten [S. 402-408]
 - I. Dynamische Herzkrankheiten
 - β. Brustgicht
 - II. Mechanische Herzkrankheiten
 - III. Organische Herzkrankheiten
- 41. Organische Herzübel insbesondere [S. 409-416]
 - I. Substanzfehler des Herzens
 - II. Hemmung des Herzens
- 42. Anhaltende Engbrüstigkeit mit Auswurf und Fieber [S. 416-430]
 - I. Lungenschwindsucht
 - b. *Catarrhus phthisicus*
 - c. Lungenschwäche
 - β. Dyspnoë von allgem. Schwäche
 - B. Darrsucht u. Atrophie
 - II. Luftröhrenschwindsucht
 - b. Bronchialschwindsucht
 - c. Glandularschwindsucht
 - B. Schlundkopfschwindsucht
 - III. Bauchschwindsucht
 - B. Abdominelle Schleimschwindsucht
 - IV. Undeutliche Brustentzündung
 - V. Einfacher Husten
 - β. Krampfhusten
- 43. Lungenschwindsucht insbesondere [S. 430-437]
 - I. Trockne Lungenschwindsucht
 - II. Feuchte Lungenschwindsucht
- 44. Brust- und Bauchentzündung [S. 437-445]
 - I. Deutliche Brustentzündung
 - B. Scheinbare Brustentzündung
 - II. Bauchentzündung
 - B. Bauchmuskelschmerz
 - C. Bauchkrämpfe
 - b. *Coelialgia neuralgia*
 - D. *Coelialgia hydropia*
- 45. Brust- und Bauchpulsation [S. 445-448]
 - I. Brustklopfen
 - B. Halsklopfen
 - II. Bauchklopfen
 - B. Falsches Bauchklopfen

Tab.

- 46. Deutliche Brustentzündung insbesondere [S. 448-452]
 - I. Akute Entzündung der Brusteingeweide
 - II. Akute Entzündung der Brusthaut
- 47. Bauchschmerzen insbesondere [S. 452-484]
 - I. Zwerchfellentzündung
 - b. *Rheumatismus diaphragmatis*
 - c. *Spasmus diaphragmatis*
 - B. Entzündung der Speiseröhre
 - II. Milzentzündung
 - b. Muskelschmerz der Milzgegend
 - III. Nierenschmerz
 - β. Falscher Nierenschmerz
 - B. Harnleiterschmerz
 - IV. Leberentzündung
 - b. Muskelschmerz der Lebergegend
 - B. Gastrische Unreinigkeiten
 - V. Magenentzündung
 - b. Arsenikvergiftung
 - c. Muskelschmerz der Magengegend
 - B. Magenkrampf
 - b. Dreckfressen der Neger
 - β. Thonessen
 - VI. Darmentzündung
 - b. Bauchmuskelschmerz
 - B. Bauchkongestionen
 - C. Fieber mit Leibscherzen
 - VII. Bauchfellentzündung
 - VIII. Gekrösentzündung
 - IX. Netzentzündung
 - X. Darmgicht
 - XI. Kolik
 - b. *Neuralgia coeliaca*
 - XII. Entzündung der Bauchspeicheldrüse
 - XIII. Gebärmutter Schmerz
 - XIV. Lendenweh
 - XV. Rückenweh
 - XVI. Hüftweh
 - B. Krankheiten der *Synchodrosis sacroiliaca*
 - XVII. Harnblasenschmerz
 - B. Vorsteherdrüsen Schmerz
- 48. Kolik insbesondere [S. 485-499]
 - I. Windkolik
 - II. Gastrische Kolik

Tab.

- III. Metastatische Kolik
- IV. Krampfige Kolik
 - b. *Colica neuralgica*
 - c. *Colica strictoria permanens*
- B. Wechselfieberkolik
- V. Blutkolik
 - B. Abortivkolik
 - C. Lochialkolik
 - D. Tripperkolik
- VI. Nierenkolik
- VII. Mutterkolik
 - B. Nachwehen
 - b. *Hysteralgia lactea*
- VIII. Leberkolik
- IX. Bruchkolik
- X. Bleikolik
 - b. Zyderkolik
- 49. Magenkrampf insbesondere [S. 499-502]
 - I. Materieller Magenkrampf
 - B. Sodbrennen
 - C. *Ructus nidorosus*
 - II. Nervöser Magenkrampf
 - B. Magenkrampf von Magenschwäche
- 50. Harnverhaltung [S. 502-505]
 - I. Falsche Harnverhaltung
 - II. Aechte Harnverhaltung
 - b. Harnstrenge
 - c. Harnzwang
- 51. Aechte Harnverhaltung insbesondere [S. 505-510]
 - I. Entzündliche Harnverhaltung
 - II. Krampfige Harnverhaltung
 - b. Krampf der Harnröhre
 - III. Torpide Harnverhaltung
 - IV. Mechanische Harnverhaltung
- 52. Fremde Körper in der Harnblase [S. 510-515]
 - I. Blasenstein
 - b. Harngries
 - II. Harnblasengewächse
 - B. Muttergeschwülste
 - C. Vorsteherdrüsengeschwulst
- 53. Mutterkolik insbesondere [S. 515-519]
 - I. Dynamische Mutterkrankheiten
 - II. Organische Mutterkrankheiten
 - B. Geburtswehen
 - β. Scheinbare Wehen

Tab.

- 54. Auftreibung des Unterleibes [S. 520-532]
 - I. Wahre Bauchwassersucht
 - II. Falsche Bauchwassersucht
 - B. *Ascites spurius vaginalis*
 - b. *Physconia externa purulenta*
 - C. Falsche Mutterwassersucht
 - III. Bauchwindsucht
 - B. Meteorism
 - β. *Emphysema abdominale*
 - C. *Pneumatosis viscerum externa*
 - IV. Wahre Schwangerschaft
 - V. Falsche Schwangerschaft
- 55. Wahre Schwangerschaft insbesondere [S. 532-538]
 - I. Gebärmutterchwangerschaft
 - II. Schwangerschaft außerhalb der Mutter
- 56. Bauchhöhlengeschwülste [S. 538-545]
 - I. Geschwulst der Baueingeweide
 - β. Härte der Bauchmuskeln
 - II. Innerlicher Bauchbruch
 - B. Innerliche Windgeschwulst
 - III. Sackbauchwassersucht
 - IV. Innerlicher Bauchabszeß
- 57. Geschwulst der Baueingeweide insbesondere [S. 545-551]
 - I. Geschwulst der Oberbaueingeweide
 - γ. Brustkrankheiten
 - II. Geschwulst der Mittelbaueingeweide
 - III. Geschwulst der Lendeneingeweide
 - B. Lendenabszeß
 - IV. Geschwulst der Unterbaueingeweide
 - B. Hämorrhoidalleiden
- 58. Sackbauchwassersucht insbesondere [S. 551-555]
 - I. Sackwassersucht des Oberbauchs
 - II. — des Mittelbauchs
 - B. — des Bauchfells
 - III. — der Lendengegend
 - IV. — des Unterbauchs

Tab.

59. Aeußere Bauchgeschwulst
[S. 555-558]
- I. Falscher Bauchbruch
 - b. Windbruch am Unterleibe
 - B. Aeußerer Bauchabszeß
 - II. Wahrer Bauchbruch
 - III. Nabelgeschwulst
60. Leistengeschwülste
[S. 559-565]
- I. Eitergeschwulst in den Leisten
 - II. Leistenbruch
 - B. Verborgner Hode
 - III. Leistenbeule
61. Hodensackgeschwülste
[S. 565-578]
- I. Wahrer Hodensackbruch
 - β. Falscher Hodensackbruch
 - B. Scheidenhautbruch
 - II. Krampfaderbruch
 - B. Saamengefäßbruch
 - III. Hodengeschwulst
 - IV. Sackwasserbruch
 - B. Wasserblasenbruch
 - C. Bruchsackwassersucht
 - D. Fleischwasserbruch
 - V. Blutbruch
 - B. Eiterbruch
 - VI. Falscher Wasserbruch
62. Abarten des Wasserbruchs
[S. 578-581]
- I. Wasserbruch mit Darm- oder Netzbruch
 - II. Angeborener Wasserbruch
63. Geschwulst der äußern Geburtsglieder [S. 581-585]
- I. Schaamlefigeschwulst
 - B. Wahrer Schaamlefigenbruch
 - C. Falscher Schaamlefigenbruch
 - II. Harnröhrengeschwulst
 - B. Vorfall der Harnblase
 - C. Auswüchse der Harnblase
 - III. Geschwulst des Kitzlers
 - b. Scheidengeschwülste
 - B. Nymphengeschwulst
 - C. Jucken der weiblichen Schaam
 - D. Geschwüre der weiblichen Schaam

Tab.

64. Geschwulst der innern Geburtsglieder [S. 585-612]
- I. Wahre Mutterschwangerschaft
 - B. Unregelmäßige Schwangerschaft
 - II. Mutterbeugung
 - β. Krümmung der Mutter
 - III. Mutterwassersucht
 - B. Mutterödem
 - b. Entzündliche Muttergeschwulst
 - IV. Eierstockgeschwulst
 - b. Trompetengeschwulst
 - B. Innerer Milchabszeß
 - V. Bösartige Mutterverhärtung
 - B. Gutartige Mutterverhärtung
 - VI. Muttergeschwulst
 - B. Muttersteine
 - VII. Mutterpolyp
 - VIII. Klumpfrucht
 - IX. Mutterauswuchs
 - B. Mutterhämorrhoiden
 - C. Muttergeschwüre
 - X. Mutterkuchen
 - B. Blutklumpen in der Mutter
 - XI. Fruchtblase
 - B. Falsche Blase
 - XII. Wirklicher Muttervorfall
 - β. Simulirter Muttervorfall
 - B. Einschiebung der Mutter
 - XIII. Scheidenvorfall
 - XIV. Scheidengeschwulst
 - B. Umstülpung der Harnblase
 - XV. Verengung der Scheide
 - B. Verwachsung der Scheide
 - b. Verwachsung des Muttermundes
65. Geschwülste am Mittelfleische [S. 612-619]
- I. Mittelfleischbruch
 - II. Harngeschwulst
 - b. Harnfistel
 - B. Kongestionsabszeß
 - III. Mittelfleischbeule
 - B. Geschwulst der Vorsteherdrüse
 - b. Geschwulst der Cowperschen Drüsen
 - c. Geschwulst der Saamenbläschen
 - d. Harnblasenstein
 - e. Entzündung des Schnepfenkopfs
 - f. Krankheiten der Harnblase

Tab.

66. Geschwülste der männlichen Harnröhre [S. 619-621]
- I. Innere Geschwulst des Penis
 - II. Äußere Geschwulst des Penis
 - b. Phimose
 - c. *Bubonulus*
 - d. Krümmung des Penis
67. Fingergeschwülste [S. 621-623]
- I. Verletzung am Finger
 - II. Fingergeschwür
 - β. Verderbniß der Nägel
 - b. Periodischer Fingerschmerz
 - c. Winddorn der Finger
 - d. Schwamm der Fingerspitzen
68. Handgeschwülste [S. 623-625]
- I. Verletzung an der Hand
 - II. Handgeschwulst ohne Verletzung
69. Ellbogengeschwülste [S. 626-628]
- I. Knochenbruch am Ellbogengelenke
 - II. Verrenkung am Ellbogengelenke
 - β. Andre Gelenkgeschwülste
70. Schultergeschwülste [S. 628-631]
- I. Bruch der Schulterknochen
 - II. Verrenkung der Schulterknochen
 - B. Verletzung der Muskeln
 - C. Steifigkeit ohne Verletzung
71. Geschwülste am Brustkasten und Rücken [S. 632-638]
- I. Verletzung am Brustkasten und Rücken
 - II. Brüche am Brustkasten und Rücken
 - B. Geschwülste am Brustkasten und Rücken
 - III. Verderbniß des Rückgrates
 - b. Krümmung des Rückgrates
 - c. Rückenstarre
 - B. Verderbniß der Brustknochen
 - b. Krümmung der Brustknochen
 - C. Verknöcherung der Brustknochen
72. Geschwulst und Schmerz der Brüste [S. 639-644]
- I. Böse Brust mit Milchabsonderung
 - B. Entzündung der Brüste
 - b. Eiterung der Brüste

Tab.

- II. Böse Brust ohne Milchabsonderung
73. Geschwülste und Schmerz am After [S. 644-650]
- I. Aftergeschwülste
 - II. Afterschmerz
 - B. Stuhlzwang
 - C. Verengung des Mastdarms
74. Verengung des Mastdarms insbesondere [S. 651-654]
- I. Wahre Mastdarmverengung
 - b. Falsche Mastdarmverengung
 - B. Angeborene Mastdarmverengung
 - II. Krampfartige Mastdarmverengung
 - β. Zu starke Schließmuskeln
 - b. *Fissura ani Boyeri*
 - β. Gewöhnliche Fissur
75. Verderbniß des Rückgrats insbesondere [S. 654-657]
- I. Wirbelkrebs
 - b. Erweichung der Wirbel
 - II. Rückenmarkleiden
76. Schultergelenkschmerz ohne Gewaltthat insbesondere [S. 657-658]
- I. Innerer Schultergelenkschmerz
 - II. Äußerer Schultergelenkschmerz
77. Geschwülste und Steifheit des Hüftgelenks [S. 658-665]
- I. Schenkelbeinbruch
 - B. Bruch des großen Trochanters
 - C. Abweichung des Schenkelkopfs vom Halse
 - II. Schenkelverrenkung
 - III. Innerer Hüftgelenkabszeß
 - β. Äußerer Hüftgelenkabszeß
 - γ. Nerviges Hüftweh
 - b. Lendenweh
 - IV. Hinken
76. Geschwülste und Steifheit des Kniegelenks [S. 665-669]
- I. Verletzung am Kniee
 - II. Steifigkeit des Kniees
79. Geschwülste und Steifheit des Fußes [S. 669-672]
- I. Verletzung am Fuße
 - II. Steifigkeit des Fußes

Tab.

80. Blutwattung [S. 672-679]
 I. Vollblütigkeit
 II. Entzündung der Blutgefäße
 III. Kongestion
 B. Entzündung
81. Verdickung des Blutes [S. 679-682]
 I. Verschleimung des Blutes
 b. Wäßrigkeit des Blutes
 c. Säure des Blutes
 B. Fauliger Zustand
 II. Verdichtung des Blutes
82. Verderbniß der Hautfarbe [S. 682-685]
 I. Kachexie
 B. Leukäthiopie
 II. Gallsucht
 β. Gastrische Stoffe
83. Besondere Kachexien [S. 686-699]
 I. Bleichsucht
 II. Infarkten
 III. Skrofelsucht
 b. Englische Krankheit
 IV. Skorbut
 V. Lustseuche
 B. Nachkrankheiten der Lustseuche
 C. *Pseudosyphilis*
 VI. Merkurialkrankheit
 VII. Aussatz
84. Abmagerung [S. 699-706]
 I. Darrsucht
 β. Rigidität
 b. Rückendarre
 β. Rückenstarre
 γ. Mannbarwerden
 II. Eiterschwindsucht
 β. Eiterfieber
 γ. Eiterförmiger Fluß
 b. Schleimchwindsucht
 c. Milchschwindsucht
 B. Hektik
 III. Atrophie
 β. Schwind
85. Charakter der Blutflüsse [S. 706-709]
 I. Sthenische Blutflüsse
 II. Asthenische Blutflüsse
 B. Art der Blutung

Tab.

86. Unterarten der Blutflüsse [S. 710-712]
 I. Gastrische Blutflüsse
 b. Infarktuöse Blutflüsse
 II. Metastatische Blutflüsse
 III. Nervöse Blutflüsse
 B. Kongestive Blutflüsse
87. Blutflüsse durch den Mund [S. 712-718]
 I. Wahrer Bluthusten
 β. Simulirter Bluthusten
 II. Wahres Blutbrechen
 β. Falsches Blutbrechen
 γ. Simulirtes Blutbrechen
 III. Blutspucken
88. Scheidenausflüsse [S. 718-736]
 I. Mutterblutsturz
 II. Monatsreinigung
 b. Abortivblutung
 III. Geburtsreinigung
 b. Abortivreinigung
 IV. Mutterhämorrhoiden
 b. Aderknoten an der Harnröhre
 B. Infarktuöser Scheidenausfluß
 V. Scheidenblutung
 β. Blutung aus der Harnblase
 VI. Jauchsucht der Mutter und Scheide
 B. Mutterwasserfluß
 VII. Mutterfluß von Gewächsen
 VIII. Weißer Fluß
 b. *Leucorrhoea secundaria*
 c. *Leucorrhoea externa*
 d. *Leucorrhoea seminalis*
 e. *Leucorrhoea sanguinea*
 f. *Leucorrhoea insons neonatorum*
 g. *Leucorrhoea puriformis*
 IX. Frauentripper
 X. Eiteriger Scheidenausfluß
 b. *Leucorrh. purul. spuria*
 B. Eiter- und Schleimfluß durch die Harnröhre
89. Blutflüsse durch der Harnröhre [S. 736-742]
 I. Wahres Blutharnen
 β. Simulirtes Blutharnen
 II. Blasen-hämorrhoiden
 β. Gicht, Venerie, Steine
 b. Variköse Anschwellung am Blasen-halse

Tab.

- III. Harnröhrenblutung
 - β. Schwarzer Tripper
 - b. Vorsteherdrüsenblutung
- 90. Afterausflüsse [S. 742-760]
 - I. Ruhr
 - II. Einfacher, wahrer Blutdurchfall
 - β. Falscher Blutdurchfall
 - γ. Simulirter Blutdurchfall
 - III. Leberfluß
 - β. Simulirter Leberfluß
 - B. Falsche Ruhr
 - IV. Goldaderfluß
 - B. Risse am After
 - V. Schwarze Krankheit
 - β. Simulirte Meläne
 - γ. Falsche Meläne
 - B. Darmbrand
 - VI. Brechdurchfall
 - VII. Wirklicher Lymphdurchfall
 - β. Falscher Lymphdurchfall
 - VIII. Wirkliche Magenruhr
 - β. Falsche Magenruhr
 - IX. Milchruhr
 - β. Weißer Koth
 - b. Milchdurchfall
 - c. Fettdurchfall
 - X. Durchfall
 - XI. Schleimhämorrhoiden
 - B. Jauchsucht des Mastdarms
 - b. Steißfistel
 - XII. Wirkliche Schleimdiarrhöe
 - β. Simulirte Schleimdiarrhöe
 - γ. Falsche Schleimdiarrhöe
 - XIII. Wirklicher Eiterdurchfall
 - β. Falscher Eiterdurchfall
 - B. Oertliche Eiterung am After
 - β. Kongestionsabszeß am After
- 91. Ohrenausflüsse [S. 760-763]
 - I. Eiteriger Ohrenfluß
 - B. Ohrenblutfluß
 - II. Schleimiger Ohrenfluß
 - b. Vermehrtes Ohrensalmz
- 92. Augenausflüsse [S. 764-766]
 - I. Hydrorrhöe der Augen
 - II. Blennorrhöe der Augen
 - b. Phlegmatorrhöe der Augen
 - c. Milchfluß der Augen
 - III. Pyorrhöe der Augen
 - B. Brand der Augen

Tab.

- 93. Nasenausflüsse [S. 766-768]
 - I. Schleimschnupfen
 - II. Eiterschnupfen
- 94. Quelle des Hustens [S. 768-770]
 - I. Brusthusten
 - II. Kehlhusten
- 95. Mundausflüsse [S. 770-776]
 - I. Brustauswurf
 - II. Mundauswurf
 - b. Geifern
 - III. Magenauswurf
- 96. Kronisches Erbrechen [S. 776-791]
 - I. Gastrisches Erbrechen
 - β. Scheinbare Sordes
 - II. Erbrechen von großer Reizbarkeit
 - b. — der Schwangern
 - c. — von Vollblütigkeit
 - d. — von Entzündung
 - e. — als Wechselfieber
 - B. Seekrankheit
 - III. Erbrechen von Magenschwäche
 - IV. Erbrechen von Diätfehlern
 - b. Milchbrechen
 - bb. Brechen zarter Kinder
 - V. Erbrechen von Verhärtung
 - β. Gallensteine
 - γ. Metastatisches Brechen
 - VI. Erbrechen von Infarkten
 - b. Nierenerbrechen
 - bb. Harnerbrechen
 - VII. Eitererbrechen
 - β. Falsches Eiterbrechen
 - b. Durchlöcherung des Magens
 - β. Verdünnung des Magens
- 97. Harnröhrenausflüsse [S. 791-803]
 - I. Akuter Männertripper
 - β. Eicheltripper
 - II. Kronischer Männertripper
 - III. Saamenfluß
 - b. *Dysspermatismus*
 - B. Abfluß des Vorsteherdrüsensaftes
 - IV. Eiterharnen
 - β. Blasenkrätze
 - B. Simulirtes Eiterharnen
 - C. Scheidenausflüsse
 - V. Schleimharnen

Tab.

- B. Milchlarnen
- VI. Harnruhr
 - β. Simulirte Harnruhr
 - γ. Harnfluß
 - δ. Harnlenterie
- 98. Eiter, Schleim und ähnliche Stoffe [S. 804-817]
 - I. Eiter
 - b. Eiterförmiger Stoff
 - II. Schleim
 - b. Glasschleim
 - B. Speichel
 - C. Milch
 - III. Saamen
 - b. Vorsteherdrüsenstoff
 - β. Schleimfeuchtigkeit der Harnröhre
 - IV. Eiterjauche
 - b. Rhagaden
 - c. Knochenfraß
 - B. Gliedwasser
 - V. Brandjauche
 - β. Lähmung
 - B. Blut.
 - β. Scheinbares Blut
 - C. Galle
 - D. Magensaft
 - E. Harn
 - F. Thränenfeuchtigkeit
- 99. Geschwüre mit eigener Kachexie [S. 818-832]
 - I. Venerisches Geschwür
 - b. Scherlievo-Geschwür
 - B. Nicht venerisches Geschwür
 - b. Hämorrhoidalgeschwür
 - c. Menstrualgeschwür
 - d. Merkuralgeschwür
 - II. Skorbutisches Geschwür
 - B. Hospitalbrand
 - β. Wahrer Brand
 - γ. Falscher Hospitalbrand
 - III. Skrofulöses Geschwür
 - b. Rhachitisches Geschwür
 - B. Lymphatisches Geschwür
 - C. Milchgeschwür
 - IV. Abdominalgeschwür
 - V. Krebsgeschwür
 - B. Krebsartiges Geschwür
 - b. Blutschwammgeschwür
 - VI. Flußgeschwür

Tab.

- VII. Exanthematisches Geschwür
- VIII. Hydropisches Geschwür
 - B. Harngeschwür
- 100. Pustulöse Hautkrankheiten [S. 832-852]
 - I. Kinderpocken
 - II. Heiliges Feuer
 - III. Blasenausschlag
 - IV. Frieselausschlag
 - V. Krätze
 - VI. Hautgries
- 101. Fleckige Hautkrankheiten [S. 852-866]
 - I. Rothsucht
 - II. Hautbrennen
 - III. Fleckfieber
 - β. Flohstiche
 - IV. Flecksucht
- 102. Schuppige Hautkrankheiten [S. 866-873]
 - I. Raude
 - II. Schuppenaussatz
 - B. Fischschuppenaussatz
 - III. Kleingrind
 - β. Falscher Kleingrind
- 103. Hautkrankheiten mit eigener Kachexie [S. 873-880]
 - I. Symptomatische Hautkrankheiten
 - II. Erdbeerpocken
 - B. Siwwens
 - III. Venerische Hautkrankheiten
 - B. Scherlievo
- 104. Falsche Pocken insbesondere [S. 880-883]
 - I. Blasenpocken
 - B. Lokalpocken
 - II. Steinpocken
 - B. Kuhpockenfriesel
 - b. Pocken nach der Kuhpockenimpfung
- Narben von falschen Pocken
 - β. Narben von kleinen Geschwüren
- Narben von wahren Pocken
- 105. Geimpfte Kuhpocken [S. 884-887]
 - I. Aechte Kuhpocke
 - b. Geimpfte wahre Pocken
 - β. Geimpfte falsche Pocken

Tab.

- II. Falsche Kuhpocke
 - β. Oertliche Kuhpocke
 - b. Modifizierte Kuhpocke
- 106. Peteschen insbesondere
[S. 888-891]
 - I. Zufällige Peteschen
 - B. Blutfleckenkrankheit
 - C. *Purpura urticans*
 - II. Ursprüngliche Peteschen
- 107. Hautkrankheiten am Kopfe
[S. 891-895]
 - I. Kopfgrind

Tab.

- b. Weichselzopf
 - β. Falscher Weichselzopf
- II. Gesichtsrind
 - B. Finnen
 - C. Kupfer
 - D. Bösartige Nasenblätter
- 108. Reise eines Neugeborenen
[S. 895-899]
 - I. Frühgeburt
 - β. Unreife Geburt
 - II. Reife Geburt
 - β. Spätgeburt
- Stufenweise Zunahme des Embryo

re, kleine halbrunde Erhabenheiten auf der innern Unterlippe, genau auf der Lippenarterie, die des Nachts stark pulsirt; oder statt dessen, zuweilen plötzlich, eben da eine leicht entzündete, mässig brennende Stelle von 6—8 Linien Breite und Länge, mit weißblaulicher, in 3—4 langen Rissen geborstener Epidermis, die sich nach einigen Tagen abschält, worauf das Uebel, indem sich sehr bald eine neue Epidermis erzeugt, verschwunden scheint, nach einigen Wochen oder Monaten aber wiederkehrt, zuletzt auch wohl konstant, selten aber $\frac{1}{2}$ Zoll groß wird, an der innern Wange, zuweilen an der Zunge und am Gaumen erscheint, exkoriirt oder mit der weißlich-bläulichen Epidermis bedeckt, die sich an manchen Stellen sehr oft abschilfert; oft auch längs der ganzen innern Seite der Lippen und Wangen, später selbst am weichen Gaumen, viel härtliche, ungefärbte, drüsenähnliche Knötchen, die in der Substanz des Fleisches und im Zellgewebe liegen, ohne vorzuragen, und ohne alle Beschwerden; manchmal an denselben Stellen ganz flache, weißblauliche, schmerzlose Schwärungen, s. Trippergeschwür (1921.). Vergl. Lippenraude u. Grindmaul (2061. 2062.). Die fressende Lippenflechte verwüstet alles rundum, s. 1961. S. auch krebsartiges Geschwür (1934.) u. Noma (758.).

dd. 511. *C. saccatum*, Lippenknoten (*Lupia labialis*). Eine harte, unschmerzhaft, blasenförmige Geschwulst am innern Theile der Unterlippe, wie eine Erbse und größer, bleifarben oder glänzend weiß. Es ist ein fester Sack, der eine gallertartige Flüssigkeit enthält, sich bisweilen von selbst öffnet, aber auch neuerdings füllt, und übrigens ohne Gefahr. S. Sackgeschwulst (179.)

VII. 512. Gesichtsschmerz. *Prosopalgia*.

Ein beschränkter oder verbreiteter Schmerz, vorzüglich an den Wangen, der nicht von der Kiefer-, Nasen-, Augen-, Stirn-, Mund- oder Ohrhöhle, noch von den Zähnen, Lippen oder Drüsen ausgeht, an sich ohne Mundklemme u. a. Krämpfe, obwohl theils der heftige Schmerz, theils die etwanige Geschwulst (*Meloncus primarius*), Schwebbeweglichkeit des Unterkiefers, Spannung und kleine Krämpfe erregen kann. Das Ausziehen der Zähne hilft nichts.

a. 513. *P. inflammatoria (Melitis)*. Anhaltender Schmerz in den fleischigen Theilen, mit Entzündungsgeschwulst (126.), die unter Klopfen, Frösteln etc. gern in Eiterung geht, doch ohne Gemeinschaft nach innen, z. B. mit dem Thränensack (652.) oder einer Zahnhöhle.

b. 514. *P. Fothergilli (Neuralgia facialis)*. Dieses sehr hartnäckige und martervolle Uebel befallt Personen von 40 Jahren und drüber, selten jüngere, nie Kinder. Der Schmerz entspringt irgendwo im Gesicht, und behauptet dann in seiner Richtung gewöhnlich eine auffallende Gleichförmigkeit; meistens ist er nur einseitig, nur auf eine gewisse Stelle beschränkt. Bei sehr heftigen Anfällen ergreift jedoch zuweilen ein ähnliches geringeres Gefühl auch die Umgebung, auch wohl den Gaumen, Schlund, Zunge, Zahnfleisch und die manchmal sehr empfindlichen Zähne des Oberkiefers; der Schmerz scheint dann alle Muskeln in eine krampfartige Spannung oder scheinbare Lähmung zu versetzen, so daß Schlingen und Sprechen oft erschwert wird. Er scheint in den Muskeln und Knochen zugleich zu sitzen, und wenig vom Wetter abzuhängen, wiewohl eine rauhe windige kalte Witterung ihn zu vermehren scheint; Bettwärme hat keinen Einfluß auf ihn. Anschwellung, Spannung, Hitze, Röthe bemerkt man höchst selten, die leidende Stelle ist meist sehr blaß; doch findet man sie, so wie die Temporalgefäße, bei heftigen Paroxysmen zuweilen etwas geschwollen, durch krampfartige Zusammenziehung oder Kongestion, oder die Augen nach dem Anfalle entzündet. — Er kommt ohne bestimmte und deutliche Ursache, oft aber nach heftigen Leidenschaften, gewöhnlich ohne Vorboten, manchmal nach Beängstigung, Zucken der nachher schmerz-

zenden Stelle, Ameisenlaufen, Kitzel und Zittern der Augenlider, Spannen in Gaumen und Nase. Er ist anfangs vielleicht unbeträchtlich, wie Nadelstiche, wird aber allmählig ungemein heftig und durchdringend, überaus scharfstechend oder reissend, zerrend, schießend, oder pressend, klopfend, bohrend, oft mit dem Gefühl, als werde das Gesicht zersägt, oder halbirt. Er verräth sich schon anfangs durch die schnell vorübergehenden schmerzhaften Vibrationen, die wie elektrische Schläge ruckweise an einer bestimmten Stelle des Gesichts oder Kopfs empfunden werden, von da nach verschiedenen Richtungen wie Strahlen ausgehen und eine schneidende Empfindung erregen, späterhin durch ein krampfhaftes, jählings, blitzschnelles, sehr schmerzhaftes Zucken der Gesichtsmuskeln. Er wüthet vorzüglich am Tage, und ruht die Nacht oft gänzlich. Er kommt in unbestimmt wiederkehrenden Perioden, unvermerkt, plötzlich; in der Zwischenzeit völliges Wohlsyn. Zuweilen täglich 5—6, auch wohl 10—12 Anfälle, die nicht alle gleich heftig sind; manchmal längere, vielleicht halbjährige Pausen. Der Anfall endet schnell, oft nach wenig Sekunden, ohne eine Spur zurückzulassen, manchmal mit einem Geräusch, dem Schnarren der Räder einer ablaufenden Uhr ähnlich. Ein starker Druck auf den Ursprung des leidenden Nerven verscheucht ihn oft augenblicklich. Die geringste Bewegung des Gesichts, Schlingen, Sprechen u. dergl., die sanfteste Berührung der Stelle erregt ihn, was ein stärkerer Druck derselben nicht thut. Selten und nur unwesentlich kommen fieberhafte u. a. Störungen hinzu; manchmal etwas Speichelfluß. Selten sind die Gesichtszüge (den unwillkürlichen, doch oft sehr auffallenden Ausdruck des Schmerzes abgerechnet) stark verändert; manchmal zittert die Oberlippe, oder ist aufwärts gezogen, unbeweglich. — Man unterscheidet 4 Hauptarten: *Neuralgia infraorbitalis*, die häufigste, geht vom *Foramen infraorbitale* aus, und trifft vorzüglich die Gegend unterm Auge, nach der Nase hin; *N. frontalis*, s. 483.; *N. genalis (auricularimalaris)* sitzt in den zahlreichen Verzweigungen des Antlitznerven, die sich vom *Foramen stylomastoideum* aus über das Gesicht zerästeln, wird daher in der ganzen Seite des Kopfes empfunden und läßt sich nur durch aufmerksame Beobachtung des Ursprungs und der Verbreitung des Schmerzes unterscheiden; *N. mentalis (inframaxillaris)* verbreitet sich längs dem Alveolarnerven des Unterkiefers, von dem *Foramen mentale* (in der Gegend unterm 2. Backzahn von vorne gezählt), zur Unterlippe, dem Kinne, Halse, oder rückwärts zur untern Zahnreihe und nach den Schläfen hin. Vergl. *N. mastioidea* (541^b). — S. *Neuralgia* (117.).

c. 515. *P. dysarthritica* kommt nach mehr oder weniger deutlichen Gichtbeschwerden, oder wechselt mit ihnen, und befällt selten den untern Theil des Gesichts (*Siagonogra*, Kiefergicht, *Podagra dentium*). Es ist mehr ein tauber, stumpfer Knochenschmerz, der in der Wärme gelinder wird. S. Gicht (109.)

d. 516. *P. rheumatica*, gewöhnlich Folge einer deutlichen, partiellen Erkältung, oft mit Fieber und Geschwulst verbunden, intermittirt selten mehrere Tage, ist ziehend, spannend, reißend, oft wandernd, nimmt in der Bettwärme und bei jedem Wetterwechsel zu, hindert die Bewegung der leidenden Muskeln, und wird durch äußere Reizung nicht vermehrt, eher wohl gelindert. Oft verbreitet er sich in die Kinnlade und Zähne, bisweilen mit einer saumartigen hellen Röthe um die Ränder des Zahnfleisches (s. 685.). *Rheumatismus faciei periodicus* kommt in sehr regulären Anfällen, meist des Nachts, sie dauern mehrere Minuten oder Stunden, ein sanfter Druck erneuert sie nicht. S. Rheumatismus (100.).

e. 517. *P. febricosa* kommt periodisch, immer zu derselben Stunde, ohne sichtliche Veranlassung, ist gleichmäßig, ohne krampfziges Zucken, anhaltend, oft mehrere Stunden dauernd, und trägt den Charakter des Wechselfiebers (s. 39.).

f. 518. *P. hysterica* verhält sich wie *Cephalalgia hysterica* (465.).

g. 519. *P. venerea* wie *Cephalalgia venerea* (468.).

h. 520. *P. traumatica*, unmittelbare Folge äußerer Gewaltthätigkeit, s. 263. Brüche der Gesichtsknochen sind leicht zu entdecken.

VIII. 521. Ohrenschmerz. *Otalgia*.

Dolor s. Spasmus aurium. Ohrenzwang.

Ein heftiger Schmerz, der in Einem oder beiden Ohren sitzt, sich aber zuweilen in die Umgebung verbreitet. Er ist oft mit Ohrtönen (530.) verbunden und bei Kindern nicht ungewöhnlich.

a. 522. *O. plethorica* äußert sich durch ein Gefühl von Hitze im Ohr, Drücken, Tönen, und durch die Zeichen der Kopfkongestionen (416.). — Ein wüthender Ohrschmerz befällt zuweilen Kinder in der Periode des schnellsten Wachstums (*O. crescentium*).

b. 523. *O. inflammatoria* (*Otitis*, Ohrentzündung). Die Entzündung ist aktiv oder passiv, akut oder kronisch, mit Trockenheit oder Ausfluß durch das Ohr (s. Tab. 91.) oder die Hörtrompete (1837.) verbunden; die Zufälle sind stetig. Bei *Otitis externa*, Entz. des Gehörganges, wo der Ohrfluß schon zeitig, doch meist sparsam erscheint, ist Schmerz, Hitze, sichtbare Röthe und Anschwellung im Hörgange, was sich nach den Zähnen, Wangen u. a. nahen Theilen verbreitet, Empfindlichkeit und Schwerhören; sie ist bisweilen akut, mit heftigen, selbst innern Symptomen, öfters kronisch, ohne heftige Zufälle, und verhält sich wie die Entzündungsbeule (126.), oder wie ein Rothlauf, Exanthem, Wundseyn (s. 1816^b). Bei der kronischen Otitis wird oft das Ohrenschmalz, unter schmerzhaftem Zucken und Brennen, krankhaft verändert und vermehrt (s. 1816^f), dann verliert sich die Röthe, die Oberhaut erscheint etwas aufgelockert und milchweiß, das anfangs normale oder überfeine Gehör wird schwächer, undeutlich, durch starken Schall und Kälte unangenehm affizirt, der Hörgang endlich feucht (1816^b) und exkoriirt, die Hautdrüsen schwellen, das Trommelfell leidet; öfters wird die Absonderung des Schmalzes, langsam (nach gelinder Entzündung) oder plötzlich, unterdrückt durch Erkältung, Exantheme, Gicht etc., Hörgang und Trommelfell ganz trocken, mit weißen feinen lockern Schuppen oder Pulver bedeckt, das Gehör sehr schwach, oft mit Gefühlen von Sausen und mechanischer Verletzung belästigt. — Bei *O. interna*, Entz. der Trommelhöhle, wo der Ausfluß gar nicht, oder spät, und dann auf einmal reichlich erfolgt, sitzt der Schmerz im Innern (oft auch in der, dann etwas empfindlichen, Zitzfortsatzgegend), ohne sichtbare Abnormität, ist meist überaus heftig, brennend, stechend, spannend, reißend, bohrend, klopfend, wird durch die geringste Bewegung vermehrt, verbreitet sich oft über den ganzen Kopf, affizirt selbst das Gehirn; der Kranke, der Tag und Nacht keine Ruhe hat, kann nicht kauen, nicht schneuzen, ohne die Empfindung, als fiele die ganze Trommelhöhle heraus; dabei ein starkes Fieber mit heftigen Zufällen; das Gehör ist entweder sehr fein, schmerzhaft, oder stumpf, mit *Syrismus*. Je tiefer die Entzündung sitzt, desto heftiger ist sie; sie kann schnell tödten. — Die Entz. der Hörtrompete (*Syringitis eustachiana*), meist katarrhalisch (dann veränderlich nach der Witterung), oder auch venerisch, skrofulös etc., gewöhnlich mit Schlundbräune (787.) und Entzündung oder Schleimanhäufung (673.) in der Trommelhöhle verbunden, macht Schmerz vom Munde nach dem Ohre hin, zumal beim Kauen, Schlingen, Gähnen, Schneuzen, stetes Sausen, Kitzel am Munden-

de, Verstopfung der Röhre (s. 669.). — Die Entz. des Trommelfells, die selten für sich vorkommt, verräth sich durch röthliche Färbung, Verdickung, Undurchsichtigkeit (671.), große Empfindlichkeit gegen alles Geräusch und deh nende spannende Schmerzen tief im Ohr.

c. 524. *O. purulenta*. Die Entzündung (523.) geht oft in Eiterung über, unter Zunahme der Zufälle, mit Frösteln, Gefühl von Schwere, Kälte und Klopfen im Ohre. Der Eiter geht entweder nach außen (s. 1816^{6c}), oder nach innen, manchmal fistulös. Nach der äußern Otitis kommt er zuweilen hinterm Ohre zum Vorschein (715.); nach der innern fließt er durch das zerfressene Trommelfell aus, oder durch die Gehörtrompete in den Mund (s. 1837.), oft mit großer Erleichterung, oder er stockt und macht Taubheit (s. 674.) und viel Schmerz. Knochenfraß (*O. cariosa*), der entweder aus der einfachen Eiterung oder aus venerischen, skrofulösen, arthritischen u. a. Ursachen entsteht, verräth sich durch den fixen, beengenden, nagenden, fressenden Schmerz in der Tiefe des Ohres oder im Zitzfortsatze, oft mit Empfindlichkeit der Gegenleiste und des Ohrläppchens, und endlich durch den Ausfluß (1816^{6c}); s. *Osteocopus* u. *Caries* (113. 1911.).

d. 525. *O. serosa*, die sehr häufig ist, folgt nach Erkältung, besonders des Kopfes und Ohres, nach unterdrückten Fußschweißen u. dergl. Die Zufälle sind nicht heftig, das etwanige Fieber bloß katarrhalisch, der Schmerz ist reißend, ziehend, drückend, nicht klopfend, nicht brennend, veränderlich, nachts zunehmend, oft plötzlich mit Heftigkeit eintretend und eben so schnell verschwindend, um vielleicht anderwärts zu erscheinen; der Kranke hat oft die Empfindung, als sey das Ohr voll Wasser, auch wohl Schmerz des *musculi salpingostaphylini* und der Gehörtrompete, *Syrigmus*, *Paracusis*, Schwerhören (s. 669.); die Ohrgegend ist leicht geschwollen. Zuweilen folgt ein seröser oder schleimiger zäher Ausfluß (1816^{6c} 1837.), zumal wenn etwas Entzündliches (523.) obwaltet. *O. rheumatica*, die gern auf Gliederschmerzen folgt, befällt zuweilen das äußere Ohr sehr schmerzhaft, *O. catarrhalis*, die besonders die Hörtrompete und Trommelhöhle, seltner das Trommelfell trifft (523.), ist meistens mit Schnupfen, Zahnweh (545.), Ophthalmie (565.), Angina (778.) u. a. Katarrhzufällen verbunden.

e. 526. *O. arthritica* findet bei anomaler Gicht statt, s. 109.

f. 527. *O. ab intrusis*. Insekten, Würmer u. a. fremde Körper machen oft wüthende, bisweilen den ganzen Kopf, selbst mit Hirnzufällen, einnehmende Schmerzen, auch wohl Entzündung oder Schwerhören, s. 669.

g. 528. *O. nervosa (hysterica)*, zuweilen periodisch, s. Nervenschmerz (116.), manchmal eine Neuralgie (117.).

h. 529. *O. dentaria*. Ein kariöser oder spätkommender Back- oder Weisheitszahn des Unterkiefers macht oft die heftigste *Otalgie*, auch wohl *Otitis* und Schwerhören. S. *Angina dentaria* (804.).

B. 530. Das Ohrtönen, *Syrigmus (Strepitus s. Fluctuatio s. Sonitus aurium)*, ist eine lästige Empfindung von Tönen, die von innen, nicht von außen kommen und auch bei veränderter Stellung des Kopfes, bei verstopften Ohren oder großer Stille fort dauern. Es ist entweder ein Sausen und Brausen (*Bombus*), oder ein Klingen und Läuten (*Tinnitus*), oder ein Pfeifen, Schwirren, Säuseln (*Sibilus*), oder ein Rauschen, Rasseln, Murmeln (*Susurrus*), oder ein Hämmern, Trommeln, Klopfen, Pochen (*Pulsatio, Ototechnos*). Die Ursachen (und Arten) sind fast dieselben, wie bei *Otalgie* und Schwerhörigkeit,

mit denen es oft verbunden ist, als Ursache oder Wirkung, s. 668. — Das Ohrtönen ist meist nur eingebildet (*S. spurius*), wo es längere oder kürzere Remissionen und zahlreiche Veränderungen macht, durch starkes Gehen, Bücken und überhaupt durch Blutandrang nicht vermehrt wird, oft während der Verdauung verschwindet; es ist symptomatisch oder öftrer idiopathisch, s. Tab. 31. Zuweilen aber rührt es von wirklichem Geräusch im Ohr oder dessen Nähe her (*S. verus*), und ist dann, nach Maßgabe der Ursache, stetiger und unveränderlich: hieher gehört das Klopfen bei allgemeiner oder örtlicher Plethora oder erweiterten Arterien, s. *Crotaphium* (450.); das Sausen, wenn der freie Durchgang der Luft im innern oder äußern Ohre, z. B. durch die Verstopfung der Hörtrompete oder Einbringung des Fingers, behindert ist; das Klingen oder Tosen von verdicktem Schmalz, s. (1816^L); das unleidliche Säge- oder Feilengeräusch von Vertrocknung des beweglichen Knorpels im Kiefergelenk bei jeder Bewegung desselben, wobei oft die Gegend unterm Ohr allmählig schwindet und zuweilen böse Geschwüre entstehen; vergl. *Dysecoea rigida* (671.).

IX. 531. Verletzung am Unterkiefer.

Dyscinesia maxillaris violenta.

Die Bewegung des Kiefers ist in Folge einer Gewaltthätigkeit behindert und sehr schmerzhaft, das Kauen, Saugen, Schlingen und Sprechen daher erschwert, wozu Geschwulst, Spannung, oft Sugillation, Gestank aus dem Munde und Speichelfluß, selten aber Krämpfe kommen. *S. Dyscinesia violenta* (268.).

a. 532. *Luxatio maxillae inferioris (Trismus devius)*. Man fühlt, besonders bei Versuchen zur Bewegung, vorn Ohr, da wo der Kieferknopf stehen sollte, eine Vertiefung, und in der Backe den Kronfortsatz vorstehend. *S. Verrenkung* (270.). Sind beide Seiten verrenkt, so ist der Kiefer vorgestoßen und verdreht, der Mund mehr oder weniger offen und nur mit großem Schmerz und vorstehenden Zähnen zu schließen. Ist nur Eine Seite verrenkt, so wird die Kinnlade, statt gerade herabzusinken, etwas seitwärts gegen die andre Seite herabgezogen, die Zähne stehen nicht wie gewöhnlich übereinander; zuweilen aber ist die Lage des Kinns wenig verändert, die Vertiefung an der verrenkten Stelle nur gering. — Die Rückwärtsverrenkung, wo der Mund fest verschlossen ist, ist selten.

b. 533. *Fractura maxillae inferioris*. Ist die Kinnlade auf beiden Seiten zerbrochen, so wird das Kinn nach unten und rückwärts gezogen, der Mund steht offen, indeß die hintern Bruchenden an die obere Kinnlade angezogen sind; man bemerkt eine fühlbare Ungleichheit und Krepitation. Trifft der Bruch nur Eine Seite, so ist die Verschiebung unmerklich, doch wird das hintere Ende gewöhnlich nach innen gezogen, und das Kinn nach der gesunden Seite hin und nach unten; bei genauer Untersuchung bemerkt man doch etwas Krepitation, eine widernatürliche Beweglichkeit und einige Ungleichheit. Man drücke mit der einen Hand vorn am Kinn den Kiefer niederwärts, während man mit der andern den hintern Theil des Knochens nahe bei seinem Winkel, ihn innen mit dem Daumen und außen mit den übrigen Fingern umfassend, an den Oberkiefer fest andrückt: die Bruchenden müssen sich dann bewegen, reiben und knarren. *S. Knochenbruch* (267.). Uebrigens auch ein ungleicher Stand der Zähne, und wenn der Knochen durch eine

Wunde entblöst, oder das Zahnfleisch zerrissen ist, so wird die Sache um so deutlicher.

bb. 534. *Fractura processus maxillaris*. Die Bewegung des Knochens geschieht mit Schwierigkeit, mit Schmerz in der Ohrgegend, Ohrtönen, und einigem, selbst dem Kranken hörbaren, Knarren, welches auch beim Druck auf den Kondylus erfolgt. Dabei findet man etwas Ungleichheit, oft sogar eine Spalte mit den scharfen Bruchenden, und eine Leichtigkeit, den Fortsatz in die Grube des Jochbeins zu stoßen, wenn man ihn nach vorwärts bewegt. Man bringe den Daumen inwendig an diese Gegend, umfasse mit den übrigen Fingern außen die Kinnlade und bewege sie nach allen Richtungen, so fühlt man mit den Fingern der andern Hand, daß der Fortsatz unbeweglich bleibt. Der Winkel läßt sich mehr als gewöhnlich herab- und heraufdrücken.

c. 535. *Diastasis maxillae inferioris* ist nur bei Kindern möglich, bei einem Fall, oder einer schweren Geburt, wenn dem Kinde ungeschickt in den Mund gegriffen wird. Die Erkenntniß ist leicht. S. *Diastasis* (273.).

d. 536. *Dyscinesia maxillae muscularis*. Quetschungen, Wunden der Kinnladenmuskeln etc. S. *Dyscinesia muscularis* (274.). Der Knochen ist unverletzt und richtig gestellt.

B. 537. Beschwerliches Kauen, *Bradymasesis* (*Dysmasesis*). Der Kranke kann nicht gut kauen, die Kinnladen nicht fest schließen, aber ohne Verletzung oder falsche Lage des Unterkiefers. Dieß bei der Mundfäule, dem Speichelfluß etc., dann auch bei Wunden und Quetschungen des Schlafmuskels und bei Schädelbrüchen. Bei starkem Speichelfluß und Geschwüren kleben zuweilen die Wangen ans Zahnfleisch, so daß oft bedeutende Hindernisse bei Oeffnung des Mundes entstehen. Einige Arten der Bräune, z. B. *Angina tonsillaris*, *parotidea*, machen außer der Dysphagie auch die Bewegung des Unterkiefers schmerzhaft, aber mit fühlbarer Geschwulst der entzündeten Theile, und nicht als unmittelbare Folge einer Gewaltthätigkeit. — Vergl. *Angina deva* (723.) und *hyoidea* (725.).

X. 538. Kinnbackenkrampf. *Trismus*.

Spasmus s. Rigor s. Tetanus maxillae inferioris. Capistrum. Gnathospasmus. Kinnbackenzwang.

Dieß leicht tödtliche Uebel macht, ohne Verrenkung und Bruch, die Bewegung des Unterkiefers sehr mühsam, höchst schmerzhaft oder ganz unmöglich, so daß der Mund nicht geöffnet (*Agglutinatio max. inf.*, Mundklemme) oder nicht geschlossen (*Divaricatio max. inf.*, Mundsperrre) werden kann. Der Krampf erregt oft sehr heftige Schmerzen, oft auch leichte Zuckungen im Gesicht, Hals und Brust, zumal bei Versuchen zu schlingen, seltner Zähnkloppen. Die gespannten Muskeln sind steif, oft sehr hart, oft auch geschwollen, aber ohne alle Spur von Entzündung. Zuweilen ergreift der Starrkrampf das ganze Gesicht, den Hals, die Brust u. m., und wird endlich allgemein (s. 345.). — Der Puls wird irregulär, schnell, Zungenbewegung und Schlingen erschwert, aber ohne Wasserfurcht, ohne Angst beim Anblick einer Flüssigkeit; das Sprechen geschieht nur mit den Lippen, zischend, die Stimme erlischt zuletzt ganz; das Auge ist starr, das Athmen mühsam, manchmal periodisch steckend, Stuhl und Harn unordentlich. Diese Symptome erscheinen zum

Vorbemerkungen zur Neuauflage

Die vorliegende Neuauflage von Karl Gustav Schmalz *Medizinische Diagnostik* ergänzt und erweitert die in den letzten Jahren erschienene Literatur zur medizinischen Semiotik¹ um ein Werkzeug zur Differentialdiagnose verwandter oder zeichenähnlicher Krankheitsbilder.

Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, soll an dieser Stelle auf die Grundlagen der semiotischen Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts nicht weiter eingegangen werden. Der interessierte Leser sei stattdessen auf die ausführlichen Vorbemerkungen in den Neuauflagen vor allem von J. F. H. Albers' *Lehrbuch der Semiotik*, aber auch von H. E. Suckows *Grundriss der Semiotik* sowie B. Bährs *Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie* und B. Hirschels *Der homöopathische Arzneischatz* verwiesen, die auf der Homepage des Verlages heruntergeladen werden können.²

Von daher verfolgen die nachstehenden Ausführungen ausschließlich das Ziel, die wichtigsten Merkmale herauszuarbeiten, durch die sich Schmalz *Medizinische Diagnostik* konzeptionell und inhaltlich von den anderen, bereits zur Verfügung stehenden Semiotik-Werken unterscheidet, d.h. worin sein besonderer Nutzen in der praktischen Anwendung besteht. Zunächst jedoch soll kurz auf den Autor eingegangen werden.

Karl Gustav Schmalz

Karl Gustav Schmalz (teilweise auch in der Schreibweise Carl Gustav Schmaltz) wurde am 13. September 1775 im heutigen Zeitzer Stadtteil Wildenborn als Sohn des Rittergutspächters Gottlieb Schmalz und dessen Frau Christiane Regine geb. Hempel geboren.

Im Jahr 1789 zog Karl Gustav mit seiner Mutter nach Gera, wo er das Gymnasium besuchte. Ab 1795 studierte er in Jena Medizin und promovierte dort 1798 mit der Arbeit *De mentula parva ac mutila non semper insecure*. Zu seinen Lehrern zählte u. a. einer der berühmtesten Ärzte des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, Dr. Christoph Wilhelm Hufeland, dem Schmalz später sein erstes Buch, die hier neu aufgelegte *Medizinische Diagnostik*, widmete.

¹ J. F. H. Albers: *Lehrbuch der Semiotik*. Leipzig ²1852. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2015. — R. Küttner: *Medicinische Phaenomenologie. Ein Handbuch für die ärztliche Praxis*. Leipzig 1842. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Diethardt 2019. — K. Sprengel: *Handbuch der Semiotik*. Wien 1815. Neusatz: Till Verlag, Runkel 2015. — H. E. Suckow: *Grundriss der Semiotik*. Jena 1838. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2016.

² J. Ahlbrecht: *Zur Neuauflage von Albers' Lehrbuch der Semiotik*. In: J.F.H. Albers: *Lehrbuch der Semiotik*. Pohlheim 2015, S. 7-28. — Ders.: *Zur vorliegenden Neuauflage*. In: H. E. Suckow: *Grundriss der Semiotik*. Jena 1838. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2016, S. 9-12. — Ders.: *Vorbemerkungen zur Neuauflage*. In: B. Bähr: *Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie*. Pohlheim 2016, S. 11-22. — Ders.: *Vorbemerkungen zur Neuauflage*. In: B. Hirschel: *Der homöopathische Arzneischatz*. Pohlheim 2016, S. 13-22. Alle vier Texte können als PDF-Datei unter www.verlag-ahlbrecht.de heruntergeladen werden.

1799 begann Schmalz seine berufliche Laufbahn in Lommatzsch, Sachsen. Im Jahre 1800 heiratete er Johanne Christiane Fabritius; der erste Sohn Eduard wurde am 18. Mai 1801 geboren. Das Paar bekam noch vier weitere Kinder, von denen allerdings drei jung starben. 1807 trat Schmalz als Physikus und Armenarzt in den Dienst bei Graf Hohenthal in Königsbrück, Sachsen.

1808 veröffentlichte Schmalz sein erstes medizinisches Werk *Versuch einer medizinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen*. 1816 machte er mit dem Versuch auf sich aufmerksam, bei einem sechsjährigen Jungen eine Koxalgie zu operieren; in der Folge wurde in mehreren medizinischen Publikationen über diesen Fall berichtet.

1819 verfaßte Schmalz einen Beitrag zum Jubelfest auf dem Augustusberg am 18. September 1818,³ dem 50. Regierungsjubiläum des Königs Friedrich August zu Sachsen, zu dessen Anlaß der Keulenberg in Augustusberg umbenannt wurde. Im selben Jahr erschien Schmalz Buch über die königlich sächsischen Medizinalgesetze.⁴ 1820 wirkte Schmalz maßgeblich an der Gründung einer Witwenkasse für Königsbrück mit. 1826 verlieh ihm der König von Preußen in Anerkennung seiner inzwischen in vierter Auflage erschienenen *Medizinischen Diagnostik* die Große Goldene Medaille.

Aufgrund zahlreicher Kriege und Durchmärsche durch Königsbrück hatte Schmalz als Arzt in der sächsischen Kleinstadt viel zu tun. Für seine Verdienste erhielt er schließlich von Graf Hohenthal eine lebenslängliche Pension, die es ihm erlaubte, 1836 zu seinem Sohn, dem Medizinalrat Eduard Schmalz, nach Dresden zu ziehen. Im selben Jahr initiierte er die Gründung einer Witwenkasse für Ärzte, Apotheker und Tierärzte im Königreich Sachsen. Über diese Errungenschaft verfaßte er 1841 die Schrift *Ueber Wittwenkassen und Lebensversicherungen*.⁵ In die gleiche Zeit fällt auch die Veröffentlichung von *Gerichtsärztliche Diagnostik*, einem weiteren, der medizinischen Diagnostik verpflichteten Werk,⁶ sowie 103 Artikeln für das *Encyklopädische Handwörterbuch der gerichtlichen Arzneikunde* (Leipzig 1838-40).

Am 7. Februar 1849 starb Karl Gustav Schmalz, erschöpft von einem Arzt heimkehrend, an einem Schlaganfall. Der 73-jährige war bis zu seinem Tod nicht einmal ernsthaft krank gewesen.⁷

³ Karl Gustav Schmalz: *Das Jubelfest auf dem Augustusberge am 18. Sept. 1818*. Dresden 1819.

⁴ Karl Gustav Schmalz: *Die Kgl. Sächsischen Medicinal-Gesetze älterer und neuerer Zeit: nebst den officiellen Belehrungen f. das Publikum über ansteckende Krankheiten unter Menschen u. Vieh, über Nahrungsmittel u. Gifte, Scheintod, Gemüthsranke etc.* Dresden 1819.

⁵ Karl Gustav Schmalz: *Ueber Wittwenkassen und Lebensversicherungen. Praktische und gründliche Darstellung der Grundsätze und Erfahrungen, nach welchen solche Versorgungsanstalten einzurichten und zu prüfen sind.* Dresden 1841.

⁶ Karl Gustav Schmalz: *Gerichtsärztliche Diagnostik, oder Erkenntniss und Unterscheidung zweifelhafter Gegenstände der gerichtlichen Arzneikunde, für Aerzte und Rechtsgelehrte.* Dresden 1840.

⁷ Vgl. <https://peoplepill.com/people/karl-gustav-schmalz>, abgerufen am 22.08.20.

Karl Gustav Schmalz *Medizinische Diagnostik*

Die erste Auflage von *Versuch einer medizinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen, oder Erkenntniß und Unterscheidung der innern und äußern Krankheiten mittels Nebeneinanderstellung der ähnlichen Formen*, wie der vollständige Titel lautet, erschien 1808 – zu diesem Zeitpunkt war Schmalz gerade einmal 31 Jahre alt. Doch trotz des jungen Alters seines Verfassers stellt das Werk inhaltlich nichts weniger als eine geniale Synthese, eine Art Destillat der gesamten medizinischen Literatur zur Diagnostik dar. So berichtet Schmalz in seiner Vorrede zur vierten Auflage 1825, er habe schätzungsweise 10.000 medizinische Schriften studiert, ausgewertet und die Exzerpte in seiner *Medizinischen Diagnostik* zusammengeführt – im vordigitalen Zeitalter ein unglaubliches Pensum alleine schon durch den mit der Literaturbeschaffung verbundenen Aufwand.

In der *Vorrede* berichtet Schmalz von seiner Motivation, ein derartiges Werk zu erstellen:

„Als ich zu Anfangs meiner praktischen Laufbahn die Schriften von *Wichmann* und *Dreyßig* über Diagnostik las, kam ich auf den Gedanken, das eigentlich Diagnostische in ihnen zu einer bequemern Benutzung auszuheben und zusammen zu stellen, indem mir die übrigen Bemerkungen und Erörterungen, so großen und vorzüglichen Werth sie in praktischer und mancher andrer Hinsicht haben mögen, doch nicht überall geeignet schienen, die Unterscheidung ähnlicher Krankheiten beim augenblicklichen Gebrauche derselben zu erleichtern.“ (*Vorrede*, S. 21)

Bei der Fokussierung auf die Ermöglichung einer sicheren Differentialdiagnose sollten vor allem die unterscheidenden Merkmale hervorgehoben und die Krankheiten deshalb nur in ihren charakteristischen Hauptzügen dargestellt werden:

„[N]icht eine vollendete Geschichte der Krankheit, nur das Charakteristische und Hervorstechende, das Unterscheidende, mit einiger Beziehung auf das Negative (Abweichende oder Entgegengesetzte) und Gemeinschaftliche, dieß war das Ziel, nach welchem ich strebte. Allein, um ein vollständiges Bild der Krankheit zu entwerfen, durfte keiner der Hauptzüge fehlen, es war nöthig, eine möglichst treue historische Darstellung ihrer Form, zwar in gedrängtester Kürze und mit Ausscheidung alles Zufälligen, aber doch im Zusammenhange vorzutragen, besonders auch deßhalb, weil fast jedes Uebel mit mehr als einem, oft mit sehr vielen andern zugleich, verglichen werden mußte, indem hier dieses, dort jenes Symptom Ähnlichkeit und mögliche Verwechslung darbot.“ (*Vorrede*, S. 21)

Praktisch sieht dies so aus, daß z. B. im Abschnitt „461. Gemeiner Kopfschmerz, *Cephalalgia*“ die verschiedenen pathologischen Kopfschmerzformen (z. B. rheumatischer, gichtischer, gastrischer, nervöser, katarrhalischer, congestiver usw. Kopfschmerz) in ihren jeweiligen Zeichentotalitäten (Lokalisation, Schmerzempfindung, Modalitäten der Verbesserung oder Verschlechterung, Begleitbeschwerden) exakt beschrieben und voneinander unterschieden werden. Hier sei exemplarisch die Beschreibung des gichtischen Kopfschmerzes zitiert:

„**b. 463. C. arthritica.** Entweder Symptom der regulären Gicht, oder *Arthritis retrograda* oder *incongrua* (*Cephalagra*, Kopfgicht), und aus deren Merkmalen zu errathen. Er kommt meist plötzlich, besonders nach Erkältung, Schreck, Aerger u.

dergl., mit oder ohne Fieber, ist gewöhnlich aussetzend, oft periodisch, kommt und verschlimmert sich gern gegen Abend, dauert oft mehrere Wochen, wechselt zuweilen mit Gelenkschmerzen, und hat die eignen Zeichen des Gichtschmerzes. Oefters ist es eine krampfhaftige Spannung und Ausdehnung der Kopfhäute, als würden sie mit Gewalt über die Hirnschale ausgespannt; oft sitzt der Schmerz in der Hirnhaut, zuweilen genau nach dem Laufe der Suturen. Die periodische Kopfgicht (471.) kommt gern am Ende des Herbstes, dem Anfall geht ein Jucken und Beißen vorher, und das Gefühl, als überwehe die Haare ein Wind, die Haare selbst scheinen oft ihre Lage zu verändern, sich aufzurichten. S. *Dysarthritis* (109.). — Zuweilen sitzt der Schmerz mehr innerlich, mit Schwindel, Betäubung etc. s. *Encephalgia* (472.), besonders *metastatica* (417.).“ (S. 246)

Wie man an den zahlreichen Verweisen auf andere Abschnitte des Buches sieht, stellt Schmalz *Medizinische Diagnostik* ein bis in die feinsten Verästelungen der Darstellung hinein vernetztes Gefüge inhaltlicher Bezüge und Querverbindungen dar, die beständig zwischen dem Partikularen und dem allgemeinen Charakteristischen einer Erkrankung vermitteln. So werden im vorstehenden Beispiel die örtlichen Zeichen des gichtischen Kopfschmerzes nicht nur durch den Hinweis auf die „periodische Kopfgicht (471.)“ ergänzt, sondern auch durch den Verweis auf das Schlagwort „*Dysarthritis* (109.)“ um die allgemeinen Charakteristika der Gicht (einer im damaligen Verständnis äußerst zeichenreichen chronischen Stoffwechselstörung, die in nahezu jedem Organ des menschlichen Organismus Symptome hervorzurufen in der Lage ist) vertieft und durch den Verweis auf das Schlagwort „*Encephalgia* (472.), besonders *metastatica* (417.)“ um allgemeine Informationen zum symptomatischen, also sekundären Kopfschmerz erweitert, der seine Ursache nicht im Kopf, sondern in anderweitig im Organismus lokalisierten pathologischen Zuständen hat.

Diese Querverweise ermöglichen es dem Leser, je nach Bedarf und Interesse die an der aufgesuchten Stelle gefundenen Informationen durch die Lektüre der ergänzenden relevanten Textstellen zu erweitern und zu vertiefen. Zugleich aber zieht Schmalz darin auch konzeptionell die Konsequenz aus dem medizinischen Verständnis, daß in der lebendigen Natur nichts isoliert und für sich abgeschlossen dasteht, sondern alles stets mit allem verbunden und dadurch untrennbar in einem dynamischen, physiologischen oder eben pathologischen Lebensprozeß begriffen ist.

In diesem Punkt unterscheidet sich der damalige medizinische Blick auf die Zeichensprache der gesunden und der kranken Natur grundlegend von dem der heutigen Lehrmedizin, dessen Diagnoseverständnis häufig ein sehr analytisches und zugleich statisches ist. Für das ältere, erfahrungsbasierte medizinische Krankheitsverständnis hingegen ist der Begriff des *Consensus*, d.i. die dem Organismus innewohnende Neigung von Organen und Geweben, bei der Erkrankung anderer Organe und Gewebe mitzuerkranken, von zentraler Bedeutung. Dieses Prinzip des *Consensus* definiert Johann Friedrich Herrmann Albers in seinem *Handbuch der allgemeinen Pathologie* (1842) wie folgt:

„Der Consensus ist daran zu erkennen, daß in dem konsensuellen Organe nach dem ursprünglichen Auftreten der Krankheit ein Leiden gleicher Natur nur in einem geringern Grade auftritt. Die Entzündung erregt in dem konsensuellen Theil eine gelindere Entzündung, oder eine Reizung und Kongestion. Liegt in dem konsensuellen Organ eine besondere Disposition zur Krankheit, so kann das konsensuelle Leiden heftiger werden, als das ursprüngliche. Der einfache Gastricismus, Reizung des Ma-

gens, wird die Ursache zu einer konsensuellen Hirnentzündung, wenn Kummer, Sorgen, Affekte die Disposition zur Hirnentzündung entwickelt haben. — Es wird der Consensus daher mit Recht die gegenseitige Beziehung zweier oder mehrerer Theile zu einander genannt, vermöge welcher sich die eigenthümliche Lebensstimmung des einen in dem andern in gleicher oder doch ähnlicher Art ausdrückt.“⁸

Schmalz Konzept der intertextuellen Verknüpfung partikularer und allgemeiner Charakteristika in *Medizinische Diagnostik* ist demnach als formale Mimesis an dieses, in der lebendigen, kreatürlichen Welt jedes lokale Phänomen stets mit dem Allgemeinen verbindende Prinzip zu verstehen, das sich als Sprache der Natur, physiologisch die der Gesundheit, pathologisch aber als die der Krankheit ausdrückt.

Damit man sich bei der Vergleichung des Ähnlichen nicht allzusehr in den jeweiligen Details verliere, war es für Schmalz von essentieller Wichtigkeit, zu jeder Zeit wieder im Rahmen einer vogelperspektivischen Schau auf alle Möglichkeiten einen Perspektivwechsel vornehmen und den Überblick über das Ganze wiedererlangen zu können. Aus diesem Grund entschied er sich für eine Darstellung in Tabellenform:

„Die Tabellenform schien mir hiezu ganz vorzüglich nützlich. Wenn der Ungeübte alles zu Verwechselnde an einander gereiht mit Einem Blicke überschaut, so wird er hoffentlich schneller und sichrer unterscheiden, als bei der abgesonderten Aufstellung der Krankheiten in den gewöhnlichen Handbüchern.“ (*Vorrede*, S. 21)

Schmalz Ordnungsprinzip der Krankheiten und Krankheitszeichen ist also kein systematisches im Sinne einer Nosologie, sondern orientiert sich bei der Zusammenstellung der auf einer Seite oder Doppelseite des im Original extrem großformatigen Werkes (43 x 26 cm!) erfaßten Krankheitsbilder stets an deren phänomenologischer Ähnlichkeit.

So werden etwa nach der Darstellung des eigentlichen Rheumatismus und der diesem in vielen Schmerzaffektionen ähnlichen Gicht im Abschnitt „110. Falscher Gliederfluß. *Rheumatismus spurius*.“ verschiedene Varietäten rheumatoformer Schmerzen abgegrenzt, die aber dezidiert nicht-rheumatischen Ursprungs, d.h. im damaligen Verständnis der Rheumatosen nicht auf eine Unterdrückung der Hauttätigkeit durch Erkältung zurückzuführen sind, z. B. syphilitisch, fieberhaft, nervös, toxisch etc. bedingte symptomatische Gliederschmerzen, die man – bei oberflächlicher Betrachtung – leicht für rheumatische halten könnte und mit einer entsprechend eingeleiteten anti-rheumatischen Therapie fehlbehandeln würde.

Wie die entsprechende tabellarische Umsetzung konkret aussah, verdeutlicht exemplarisch die Abbildung auf der nachfolgenden Seite, auf der im Zuge der Darstellung der Augenerkrankungen die verschiedenen Entzündungsformen des äußeren Augapfels (*Syndesmitis*, *Skleritis*, *Keratitis*, *Chorioiditis* etc.) mit ihren sämtlichen Krankheitszeichen dar- und einander gegenübergestellt werden.⁹

⁸ Johann F. H. Albers: *Handbuch der allgemeinen Pathologie*. Erster Theil. Bonn 1842, S. 72f.

⁹ Da es bei der Abbildung ausschließlich um die optische Wiedergabe des tabellarischen Konzeptes geht, bitte ich darüber hinwegzusehen, daß der abgebildete Text aufgrund der Verkleinerung des Formats auf etwa ein Drittel seiner ursprünglichen Größe nicht im Detail lesbar ist; die entsprechenden Passagen finden sich im Neusatz auf den Seiten 274-279.

Inhaltlich berücksichtigen die Darstellungen der Krankheitsbilder stets die vollständig erfaßte lokale Detailsymptomatik ebenso wie das Wissen darüber, welche Konstitutionen oder Diathesen im Besonderen für diese oder für jene Erkrankung prädisponiert sind. So finden sich etwa im Abschnitt zum Erysipel nach der genauen Beschreibung der lokalen Symptomatik und Dynamik folgende Hinweise auf das der vermeintlich rein örtlichen Erkrankung zugrundeliegende diathetische und konstitutionelle Terrain:

„**105^b Ächte Rose, Erysipelas vera.** [...] Sie [d.i. die Rose] wird vorzüglich durch Gallenreitze erzeugt, auch wohl durch Erkältung, und befällt gern empfindliche, skrofulöse, oder kakochymische, vollsaftige Körper, selten Kinder. Manche haben besondere Neigung dazu (*E. habituale*), zumal bei Leberkrankheiten, Hämorrhoidal- und Menstrualkongestionen, Infarkten, gichtischer oder katarrhalischer Disposition.“ (S. 105)

Auf diese Weise findet sich stets das Lokale sinnhaft mit dem Allgemeinen verbunden und in Relation gesetzt, wodurch jede für sich stehende, isolierte Krankheitserscheinung immer auch einen Bezug zum erkrankten Individuum erhält und nicht, wie in der heutigen Lehrmedizin üblich, abstrahierend aus dem Zusammenhang des Lebendigen herausgerissen wird. Gerade die Möglichkeit einer Zuordnung lokaler Erscheinungen zu einer sämtlichen Beschwerden und Leiden eines Kranken zugrundeliegenden Diathese hat ganz erhebliche Auswirkungen auf den therapeutischen Ansatz, da nur die Therapie der zugrundeliegenden Diathese wirklich kausal ist, jede bloß lokale Fokussierung hingegen stets Gefahr läuft, lediglich auf der Ebene des partikularen, von der Diathese motivierten Zeichens symptomatisch-palliativ zu unterdrücken.

Um innerhalb dieses sehr komplexen Darstellungsgefüges eine leichtere Auffindbarkeit des jeweils Gesuchten zu ermöglichen und die Navigation innerhalb des Werkes zu vereinfachen, kennzeichnete Schmalz jedes einzelne diagnostisch unterschiedene Krankheitsbild im Zuge einer fortlaufenden Numerierung (insgesamt 2.134 verschiedene Schlagworte) und erstellte am Ende des Werkes das *Register*, einen alphabetischen Index, der aufgrund der flankierenden Verschlagwortung auch der lateinischen Diagnosebezeichnungen und Synonyme etwa 7.000 Einträge umfaßt und das jeweils Gesuchte ebenso sicher wie schnell auffinden läßt.

Das dergestalt konzipierte Werk scheint den Interessen und Bedürfnissen der medizinischen Kollegen mehr als entsprochen zu haben, denn es wurde vom Berufsstand äußerst positiv aufgenommen. Um nur ein Beispiel für die hervorragenden Kritiken zu geben, die Schmalz schon nach Erscheinen der ersten Auflage seiner *Medizinisch-chirurgischen Diagnostik* erhielt, sei hier eine Rezension aus *Hufelands Bibliothek der practischen Heilkunde* (Mai 1811) zitiert:

„Dieses Werk ist in Absicht sowohl der Idee als der Ausführung, als eines der verdienstlichsten und mühevollsten zu betrachten, die wir seit langem erhalten haben. Das Werk ist in seiner Art einzig. Es enthält einen ungeheuren Reichtum von lauter dem Heilkünstler unentbehrlichen und wissenswürdigen Dingen, so daß es der Rezensent in die Bibliothek eines jeden praktischen Arzte aufgestellt wünschen muß.“

In der Folge erlebte die *Medizinische Diagnostik* bis 1825 insgesamt vier Auflagen, für die das Werk jeweils überarbeitet, aktualisiert und erweitert

wurde.¹⁰ Die vierte und letzte Auflage wurde 1830 noch einmal in einer unveränderten Ausgabe in Wien nachgedruckt.

Für diejenigen, die auch im 21. Jahrhundert von dem ungeheuren Erfahrungswissen der alten, zeichenbasierten Medizin profitieren wollen und dieses in ihrer Praxis einsetzen möchten, stellt Schmalz *Medizinische Diagnostik* in zweifacher Weise eine enorme Bereicherung dar:

Zum ersten fungiert das Werk aufgrund des eben angesprochenen alphabetischen *Registers* am Ende des Werkes für den Adepten der Semiotik als ein nahezu vollständiges Wörterbuch der in der alten Medizinsprache gebräuchlichen Diagnosebegriffe und kann dadurch wesentlich zu einem besseren Verständnis der alten Texte beitragen. Viele Semiotik-Adepten, die sich in den letzten Jahren dem Wissen der alten zeichenbasierten Medizin über die semiotischen Nachschlagewerke, z. B. von Albers, Küttner, Suckow oder Sprengel¹¹ anzunähern versucht haben, sahen sich beim Nachschlagen von Krankheitszeichen mit einer Vielzahl von klinischen Begriffen konfrontiert, mit denen sie zunächst wenig anzufangen wußten und deren jeweilige Bedeutung sie sich erst in diversen anderen Quellen erarbeiten mußten. Da Schmalz sämtliche vorkommenden klinischen Erscheinungen und Diagnosebegriffe definiert, ist hier eine rasche Orientierung in einem einzigen Werk möglich.

Zum anderen aber, und dies ist natürlich die zentrale Funktion des Werkes in der praktischen Arbeit, ermöglicht Schmalz *Medizinische Diagnostik* in umfassender Weise eine fundierte Diagnose und Differentialdiagnose von Krankheitserscheinungen auf der Basis eines semiotischen Krankheitsverständnisses, wie dies mit kaum einem anderen vergleichbaren Werk möglich ist. Besonders faszinierend erscheint hier, daß aufgrund der präzisen und hochdifferenziellen Beschreibungen der Phänomene selbst anhand von scheinbar wenig differenzierten Lokalphänomenen wie etwa einem Leistenabszeß oder einer Psoriasis sichere Unterscheidungen der den jeweiligen Krankheitszeichen zugrundeliegenden Diathesen möglich sind, indem sich etwa eine syphilitische Leistendrüsengeschwulst durch andere Lokalerscheinungen zu erkennen gibt als eine skrophulöse oder eine mercurielle etc. (vgl. Abschnitt „1263. Leistenbeule. *Bubo.*“, S. 562-565).

Essentieller Bestandteil dieser praktischen Arbeit ist das *Register* am Ende des Buches, das neben seiner Index-Funktion zumindest rudimentär auch eine systematische Orientierung ermöglicht, indem unter einem Schlagwort (z. B. *Pneumonia*, *Rheumatismus*, *Tussis* etc.) sämtliche pathologischen Formen des entsprechenden Diagnosebegriffes bzw. klinischen Zeichens aufgeführt werden. Hier wird man z. B. bei *Tussis* nicht nur auf Hustenformen, deren Ursache idiopathisch in den Atemwegen selbst liegen (z. B. katarrhalischer,

¹⁰ Karl Gustav Schmalz: *Versuch einer medizinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen, oder Erkenntniß und Unterscheidung der innern und äußern Krankheiten mittels Nebeneinanderstellung der ähnlichen Formen*. Dresden 1808, ²1812, ³1816, ⁴1825.

¹¹ J. F. H. Albers: *Lehrbuch der Semiotik*. Leipzig ²1852. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2015. — R. Küttner: *Medicinische Phaenomenologie. Ein Handbuch für die ärztliche Praxis*. Leipzig 1842. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Diethardt 2019. — K. Sprengel: *Handbuch der Semiotik*. Wien 1815. Neusatz: Till Verlag, Runkel 2015. — H. E. Suckow: *Grundriss der Semiotik*. Jena 1838. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2016.

bronchialer, pulmonaler, phthisischer Husten), sondern auch und gerade auf verschiedene consensuell bedingten Varianten (z. B. gastrisch, hepatisch, rheumatisch, gichtisch, cardial, spastisch etc. motivierten Husten) aufmerksam gemacht, die man in der Folge im Textteil studieren kann.

Unbedingt vorab zu empfehlen ist allerdings die Lektüre von Schmalz programmatischer *Einleitung* (S. 41-57), die unverzichtbare allgemeine Grundlagen der semiotischen Diagnostik enthält, sowie die des sich daran anschließenden Abschnittes *Einige Bemerkungen, den Gebrauch der folgenden Tabellen betreffend* (S. 57f.), in dem u. a. die Bedeutung von Schmalz genuiner Aufzählungs- und Gliederungssystematik erläutert wird.

Zur vorliegenden Neuauflage

Der vorliegende Neusatz von Karl Gustav Schmalz *Versuch einer medizinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen* orientiert sich orthographisch am Original. Hierzu gehören neben den bekannten historischen Eigenheiten vereinzelt auch Schreibweisen, die – wie z. B. die Ausdrücke *komplet*, *kronisch*, *Reitz* oder *Peteschen* – auf den ersten Blick wie Satzfehler erscheinen. Aus Gründen der Deutlichkeit wurde der originale Sperrdruck als satztechnisches Mittel der Hervorhebung im Neusatz durch Fettdruck ersetzt.

Leider ließ sich das ursprüngliche Vorhaben, die Neuauflage im Originalformat von 43 x 26 cm herauszubringen, nicht umsetzen, da die Druckkosten derartiger Sonderformate um ein Mehrfaches über denen gängiger Formate liegen und bei einer derart kleinen Auflage wie der vorliegenden wirtschaftlich keinen Sinn gemacht hätten. Somit mußte in der Neuauflage das synoptisch-tabellarische Konzept des Originals zugunsten eines linearen Darstellungsprinzips aufgegeben werden, wodurch sich die Inhalte einer Originalseite je nach Druckdichte des Originals auf jeweils 3-5 Buchseiten des Neusatzes verteilen. Dies hat zur Folge, daß der Leser auf die von Schmalz intendierte vogelperspektivische Schau verzichten und stattdessen die Beschreibungen verwandter und ähnlicher Zeichenbilder auf mehreren aufeinanderfolgenden Seiten studieren und vergleichen muß. Von daher erscheint es empfehlenswert, sich vor dem Studium eines (zumal umfangreicheren) Abschnittes in der vor den eigentlichen *Diagnostischen Tabellen* plazierten *Inhaltsanzeige* (S. 27-39) über die Grobstruktur desselben zu orientieren.

Ein großer Vorteil des Neusatzes liegt allerdings darin, daß es hier durch die Aufgabe der Originalpaginierung möglich war, die Texte von der Schriftgröße her so gestalten, daß sie ein bequemes Lesen gestatten – waren doch die Darstellungen im Original aus Gründen der konzeptionellen Festlegung auf eine Seite oft in derart kleinen Lettern gesetzt, daß die Schrift teilweise nur mit einem Vergrößerungsglas zu entziffern ist – ein Umstand, dem auch ein Neusatz im Originalformat nicht immer hätte entgehen können.

Da aufgrund dieser Gestaltung des Neusatzes der originale Titel *Versuch einer medizinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen, oder Erkenntniß und Unterscheidung der innern und äußern Krankheiten mittels Nebeneinanderstellung der ähnlichen Formen* irreführend gewesen wäre, wurde der Titel auf *Medizinische Diagnostik* verkürzt. Die damit einhergehende ‚Unterschlagung‘

des für Schmalz wichtigen Elementes der chirurgischen Diagnostik geschah allein aus Gründen der Prägnanz – damit sollen keineswegs Wichtigkeit und Wertigkeit der im Werk aufgeführten chirurgischen Indikationen geschmälert werden, denn studiert man etwa die entsprechenden differentialdiagnostischen Darstellungen zu den Frakturen, Luxationen, Verwundungen etc., kann man nur den Hut ziehen vor einem klinischen Wissen, das auf der Basis von genauer Beobachtung und körperlicher Untersuchung sowie der Berücksichtigung verschiedener Modalitäten in der Lage ist, auch ohne Röntgen und MRT exakte diesbezügliche Diagnosen zu stellen. Dasselbe gilt im übrigen auch für die in ihrer Präzision extrem beeindruckenden gynäkologischen Indikationen.

* * * * *

Ich widme dieses Buch meinem Freund und Kollegen Dr. med. Dieter Till, der im Juni 2020 viel zu früh verstorben ist und ohne den die in den letzten fünf Jahren erfolgte Wiederentdeckung, Erschließung und Vermittlung des alten semiotischen Wissens in der Weise nicht möglich gewesen wäre. Nachdem die Anfangszeit dieser gemeinsamen ‚Rekonstruktionsarbeit‘ von der Intention geprägt war, semiotische Nachschlagewerke verfügbar zu machen, mit denen auf Basis der verschiedenen Zeichen eines Krankheitsfalles eine semiotische Diagnose ‚reperorisiert‘ werden kann,¹² und in der Folge sich der Fokus auf die Veröffentlichung von Werken richtete, in denen sich zumindest die gängigsten Krankheiten hinsichtlich ihres jeweiligen Zeicheninbegriffs und ihrer Verläufe semiotisch dargestellt finden,¹³ fehlte es schon seit längerem an einem Werk, das auf der Grundlage sowohl der partikularen als auch der allgemeinen Charakteristik eine verlässliche Differentialdiagnose der einzelnen Krankheitsformen und Diathesen ermöglicht. Nachdem Dieter Till und ich die *Medizinische Diagnostik* von Schmalz längere Zeit und mit großem Nutzen in der Praxis eingesetzt hatten und ich ihm Anfang 2020 zum ersten Mal von meinen Überlegungen bezüglich einer Neuauflage des Werkes erzählte, begrüßte er das Vorhaben nachdrücklich, denn er war wie ich zu der Auffassung gelangt, daß es kein vergleichbares Werk in der alten Medizin gibt, das die benannten Bedürfnisse so erfüllt wie das Schmalz’sche Werk.

Von daher ist es mir eine große Freude, Dieter Till diesen Neusatz posthum zu widmen, und ich übergebe das Werk dem Berufsstand in der Hoffnung, daß möglichst viele Kolleginnen und Kollegen von dem darin enthaltenen Wissen profitieren und dadurch selbständig und unabhängig von der apparate- und laborbasierten Diagnostik unserer Zeit zu verlässlichen eigenen Diagnosen kommen und darauf ihre anschließende Therapie gründen mögen.

Diethardt, im November 2020

Jens Ahlbrecht

¹² J. F. H. Albers: *Lehrbuch der Semiotik*. Leipzig ²1852. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2015. — R. Küttner: *Medicinische Phaenomenologie. Ein Handbuch für die ärztliche Praxis*. Leipzig 1842. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Diethardt 2019. — K. Sprengel: *Handbuch der Semiotik*. Wien 1815. Neusatz: Till Verlag, Runkel 2015. — H. E. Suckow: *Grundriss der Semiotik*. Jena 1838. Neusatz: Verlag Ahlbrecht, Pohlheim 2016.

¹³ B. Bähr: *Die Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie*. Pohlheim 2016. — B. Hirschel: *Der homöopathische Arzneischatz*. Pohlheim 2016.



Karl Gustav Schmalz

[Medizinische Diagnostik](#)

976 Seiten, kart.
erschienen 2020



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und
gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de